

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

- Le vamos a operar de glaucoma. Esta operación consiste en buscar una nueva salida del líquido que rellena el ojo al exterior para así reducir la presión intraocular.
- Si también le vamos a operar de catarata, le citaremos antes de la cirugía para medir la lente que se le va a colocar.
- Se pueden usar varios tipos de anestesia para la cirugía de glaucoma. Según la indicada, recibirá o no una valoración por el Servicio de Anestesia.

INTRUCCIONES PARA EL DÍA DE LA CIRUGÍA

- Tome sus medicinas como siempre, a menos que el doctor diga lo contrario.
- No coma ni beba nada al menos 6 horas antes de la cirugía.
- Debe acudir al hospital acompañado de un adulto. Venga duchado.
- Si usted es alérgico a algún producto o medicamento, debe informar siempre al personal sanitario.

DÍA DE LA CIRUGÍA

- Le llamaremos para decirle el día y la hora de la cirugía.
- Acuda al bloque quirúrgico en la **1ª planta, letra A, color azul del hospital**.
- Le llamaremos para que entre a la Unidad de Adaptación al Medio (UAM). Allí se cambiará de ropa, marcaremos el ojo y lo prepararemos para la cirugía. También le echarán gotas si se opera de catarata. En caso de anestesia local, el personal sanitario le pondrá una inyección en el párpado.
- Durante la cirugía usted estará despierto y un poco sedado para que esté tranquilo (a no ser que se haya indicado una anestesia general). Estará acostado boca arriba. La cirugía durará entre 1 y 2 horas.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA CIRUGÍA

- Puede irse a su casa después de la cirugía, sin necesidad de quedarse en el hospital. Si la anestesia es general, deberá quedarse en el hospital unas horas.
- Siempre que tenga que echarse más de dos gotas diferentes, espere 5 minutos entre cada una.

- No coja peso ni agache la cabeza. Si tose, hágalo con la boca abierta. Es muy importante para el éxito de la cirugía.
- Muchos de los pacientes saldrán con el ojo tapado. Manténgalo así sin necesidad de echar gotas hasta que lo destapemos al día siguiente en la consulta. Una vez destapado, no debe frotar el ojo operado, aunque los puntos le ocasionen molestia.
- No se apoye sobre el lado operado al dormir hasta que el personal sanitario se lo recomiende.
- No conduzca hasta que su oftalmólogo le de permiso.
- Tras la cirugía se le informará de la pauta de los colirios que deberá echarse en los días posteriores a la cirugía.

ACUDIRÁ A URGENCIAS EN CASO DE:

- * Importante dolor y ojo rojo que empeora con el tiempo.
- * Pérdida llamativa de la visión.
- * Aparición de legañas.
- * Destellos de luz con partículas flotantes que progresan a una pérdida de visión.

EN EL SIGUIENTE CÓDIGO QR PODRÁ ESCUCHAR ESTE DOCUMENTO: