

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

- El tratamiento con inyecciones intravítreas se realiza en el **Quirofanito-Consulta 25, situado en la planta baja, línea azul.**
- No es necesario acudir en ayunas ni acompañado.
- A su llegada deberá meter la tarjeta sanitaria en las máquinas preparadas para ello en el vestíbulo de entrada. Recoja el número y diríjase a la sala de espera n.º 2 y 3. Allí será nombrado por dicho número de ticket por la pantalla.
- El personal sanitario le recibirá en la puerta de entrada al quirofanito, donde le indicará las instrucciones que debe seguir.

ANTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MEDICAMENTO COMUNIQUE:

- Si ha sufrido un accidente cerebrovascular o ha tenido signos pasajeros de accidente cerebrovascular (debilidad o parálisis de las extremidades o la cara, dificultad en el habla o en la comprensión).
- Si tiene o ha tenido en los días previos el ojo rojo, secreciones, dolor ocular o pérdida brusca de visión.
- Si tiene alergia a algún tipo de producto o medicamento.

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL TRATAMIENTO?

- Consiste en una inyección en el ojo, que realiza su oftalmólogo.
- Es normal preocuparse por este tipo de inyecciones, pero los pacientes sometidos a este tratamiento manifestaron que a menudo la inyección es prácticamente indolora.
- El personal sanitario limpiará el ojo y la piel de alrededor y le cubrirá la cara y la zona alrededor del ojo con un paño especial.
- Mantendrá su ojo abierto para que no pueda parpadear.
- Se pondrá anestesia en el ojo para que no sienta dolor.
- A continuación, el personal sanitario efectuará la inyección en la parte blanca del ojo. Puede que sienta una ligera presión con la inyección.

RECOMENDACIONES TRAS LA INYECCIÓN

- Puede llevar a cabo su vida habitual, manteniendo los cuidados de higiene habitual (lávese las manos antes de tocarse los ojos).
- No deberá frotarse los ojos, ni sumergirse en piscinas o equivalentes.
- La parte blanca del ojo, donde se aplica la inyección, es probable que esté enrojecida. Este enrojecimiento es normal y desaparecerá en unos días.
- Es posible que vea manchas o “moscas volantes”. Estas manchas son normales y desaparecerán en unos días.
- Es posible notar una pequeña burbuja de aire flotando. Esto es normal y desaparecerá en pocos días.
- Se recomienda el uso de lágrimas artificiales con frecuencia (cada 3-4 horas) el mismo día de la inyección y los siguientes para disminuir las molestias asociadas al proceso.

ACUDIRÁ A URGENCIAS EN CASO DE:

- * Importante dolor y ojo rojo que empeora con el tiempo.
- * Pérdida llamativa de la visión.
- * Aparición de legañas.
- * Destellos de luz con partículas flotantes que progresan a una pérdida de visión.

EN EL SIGUIENTE CÓDIGO QR PODRÁ ESCUCHAR ESTE DOCUMENTO:

