

¿INTERVENCIÓN DE PATOLOGÍA PALPEBRAL?

- Como le ha explicado su oftalmólogo en la consulta, se le va a realizar una operación sobre sus párpados.
- La operación suele ser con anestesia local y sedación, salvo excepciones en que se necesitará anestesia general. Si todo va bien, se irá a casa en 20-30 minutos después de la cirugía.

DÍA DE LA CIRUGÍA

- Se le avisará unos días antes para decirle el día y la hora que tiene que acudir al quirófano.
- Los quirófanos se encuentran en la **1ª planta, letra A, color azul**.
- No coma ni beba nada al menos 6 horas antes de la cirugía.
- Debe acudir al hospital acompañado de un adulto.
- Si usted es alérgico a algún producto o medicamento, debe informarlo siempre al personal sanitario.
- Tome sus medicinas habituales, a menos que su oftalmólogo le haya dicho lo contrario. El tratamiento con anticoagulantes o antiagregantes normalmente será retirado unos días antes de la intervención.

DESPUÉS DE LA CIRUGÍA

- Cuando acabe la operación el personal sanitario saldrá a informar a su acompañante y le dará el informe de lo que se le ha hecho y las instrucciones para los primeros días además de la cita para la revisión.
- Puede irse a su casa después de la cirugía, sin necesidad de quedarse en el hospital. Si la anestesia es general, deberá quedarse en el hospital unas horas.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA CIRUGÍA

- Los primeros días es normal tener molestias, inflamación, edema, hematomas, etc., en la zona de la intervención que se pueden extender a ambos párpados e incluso hacia la mejilla en el ojo operado. Irá mejorando día a día, pero puede persistir incluso 1-2 semanas.
- Si sale con el ojo tapado, manténgalo así hasta que lo destapemos el día de la cita o hasta el día que le indique su oftalmólogo, sin ponerse tratamiento, salvo que se indique lo contrario.
- Puede hacer su vida normal, pero mantenga la herida limpia y no se bañe en piscinas durante el primer mes.
- Se lavará la herida quirúrgica con agua y su jabón habitual (neutro) 2 veces al día, evitando las costras sobre los puntos.
- Si hay hematoma, se puede aplicar frío local 2-3 veces al día en la zona.
- Se pondrá el tratamiento que le indique su oftalmólogo en el informe.
- Habitualmente los puntos se retiran en consulta entre 10 y 20 días tras la intervención.

ACUDIRÁ A URGENCIAS EN CASO DE:

- * Importante dolor y ojo rojo que empeora con el tiempo.
- * Pérdida llamativa de la visión.
- * Aparición de legañas.

EN EL SIGUIENTE CÓDIGO QR PODRÁ ESCUCHAR ESTE DOCUMENTO:

