

INFORMACIÓN PREVIA A LA VACUNACIÓN FRENTE A COVID-19 EN PACIENTES QUE REQUIEREN DOSIS ADICIONALES.

El objetivo de la Estrategia de vacunación frente a COVID-19 es proteger a la población más vulnerable de sufrir enfermedad grave y complicaciones por infección con SARS-CoV-2.

Se dispone de evidencia científica de la pérdida de efectividad en la pauta completa de vacunas frente a COVID-19 con el tiempo, sobre todo en las personas mayores o con condiciones que cursan con inmunosupresión. La administración de una dosis adicional en estas personas puede mejorar de manera importante la respuesta inmune a la vacunación. En la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad se aprobó el 16 septiembre 2021 la administración de dosis adicionales en pacientes con las siguientes condiciones: receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos, receptores de trasplante de órgano sólido, tratamiento sustitutivo renal (hemodiálisis y diálisis peritoneal), tratamiento quimio y radioterápico previo, inmunodeficiencias primarias., infección por VIH con menos de 200 CD4/ml, fibrosis quística, síndrome de Down con 40 o más años de edad (nacidos en 1981 o antes) y pacientes en tratamiento inmunosupresor

Usted siguiendo las anteriores recomendaciones y las de los profesionales que le atienden, ha sido citado a través de SMS para recibir vacuna frente a COVID-19 en el Hospital Infanta Sofía. Deberá traer su tarjeta sanitaria y DNI. La dosis adicional para completar la pauta se realizará con vacuna de ARNm (Comirnaty-Pfizer o Spikevax-Moderna), preferentemente con el mismo tipo vacuna administrada con anterioridad, y con una separación de al menos 28 días tras la segunda dosis.

Debe **acudir el día, lugar y hora programados, puntualmente a la hora citada**, para reducir aglomeraciones. En el SMS puede consultar tanto la hora como el lugar de vacunación indicado, verifíquelo antes de acudir a la vacunación.

Importante:

- No debe acudir si está pasando actualmente COVID, o está en aislamiento por ser contacto de un caso COVID.
- La vacunación está contraindicada en personas con historia de reacción alérgica a algún componente de la vacuna o a la dosis previa de la vacuna recibida. Debe consultar con su médico en caso de haber tenido una reacción alérgica grave a un medicamento que no haya sido estudiada o a una vacuna previamente. El resto de alergias animales, alimentos, insectos, látex, pólenes y reacciones no graves a medicamentos no tienen ninguna contraindicación para recibir la vacuna.
- En caso de estar recibiendo tratamiento anticoagulante:
 - Si se trata de inyecciones de heparina o anticoagulantes directos: dabigatrán (Pradaxa), rivaroxabán (Xarelto), apixabán (Eliquis), edoxabán (Lixiana), debe retrasar la dosis el día de la vacunación hasta después de la vacuna, pero no es necesario omitir ninguna dosis.
 - Los pacientes en tratamiento antiplaquetario: aspirina (Adiro o Tromalyt), clopidogrel (Plavix)) pueden continuar su tratamiento sin ningún ajuste
 - Los pacientes anticoagulados con warfarina (Aldocumar) o acenocumarol (Sintrom) deberán informar sobre sus últimos controles de INR para valoración, en el momento en que se administre la vacuna.

Muchas gracias por su colaboración.