

INFORMACIÓN TRAS LA VACUNACIÓN FRENTE A COVID-19

La vacunación frente a la COVID-19 constituye actualmente una medida clave para superar la pandemia que estamos sufriendo. La vacuna frente al COVID-19 protege de desarrollar un cuadro grave en caso de enfermar.

Usted acaba de recibir la vacunación frente a COVID-19 con la vacuna Pfizer®. A continuación, le detallamos una serie de recomendaciones:

- Recibirá cita para una segunda dosis a partir de los 21 días desde hoy.
- La máxima protección no se alcanza hasta pasados 7 días de la segunda dosis.
- La vacuna frente al COVID-19 protege de desarrollar un cuadro grave en caso de enfermar, pero en pacientes inmunodeprimidos la protección puede ser menor. Es muy importante **seguir manteniendo las medidas de prevención** (mascarillas, distancia social, lavado de manos, cuarentena tras una exposición).
- Es posible que pueda sufrir algunos **efectos secundarios** tales como inflamación y dolor en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular o de articulaciones, escalofríos y fiebre, náuseas y vómitos, todos ellos generalmente de intensidad leve o moderada y que se resuelven pasados dos o tres días.
- Si en los primeros dos días presenta fiebre, dolores de cabeza, osteomusculares, o en zona de inyección puede tomar paracetamol (salvo alergia conocida al mismo).

Muchas gracias por su colaboración.