

NORMAS PARA LA EXTRACCIÓN DE HEMOCULTIVOS EN ADULTOS

1. ASEPSIA DE LOS FRASCOS

- Alcohol 70° o Povidona yodada
- Dejar secar



3. VENOPUNCIÓN:

- Extracción de 10 mL de sangre
- No extraer a través de catéter***



4. INOCULACIÓN DE LOS FRASCOS:

- Repartir los 10 ml en los dos frascos



2. ASEPSIA DE LA PIEL

- Elegir la vena: vía periférica
- Alcohol 70° + Povidona yodada
- Dejar secar



NO VOLVER A PALPAR DESPUÉS DE DESINFECTAR

* Solo extraer a través de catéter en **sospecha de bacteriemia asociada a catéter** junto con extracción por punción periférica, indicándolo en la botella


5. EXTRACCIÓN SERIADA DE LOS HEMOCULTIVOS



1º extracción



2º extracción



3º extracción

SIEMPRE SITIOS DIFERENTES DE VENOPUNCIÓN

6. ROTULAR LOS FRASCOS

- Nombre paciente
- N° extracción o vía
- Dejar libre el código de barras
- No cubrir los tapones



ENVÍAR A MICROBIOLOGÍA INMEDIATAMENTE: TUBO NEUMÁTICO N° 103 o 538



Hospital Universitario
La Paz
Hospital Carlos III
Hospital Cantoblanco

