

# HEMOCULTIVOS PEDIÁTRICOS

## 1.- ASEPSIA DE LOS FRASCOS

- Neonatos: Clorhexidina acuosa 1%
- Niños: Clorhexidina acuosa 2%



## 3.- VENOPUNCION E INOCULACIÓN DEL FRASCO

- Neonatos 1,5 ml
- Lactantes 2,5 ml
- Niños 4 ml
- Adolescentes 10 ml
- **NO EXTRAER A TRAVÉS DEL CATETER\***



## 5.- ROTULAR LOS FRASCOS

- Nombre del paciente
- N° extracción o Vía
- Dejar libre el código de barras
- No despegar pegatina de código de barras
- No cubrir tapones

## 2.- ASEPSIA DE LA PIEL


- Elegir la vena: siempre vía periférica
- Alcohol de 70º + Povidona Yodada
- Dejar secar

**NO VOLVER A PALPAR DESPUÉS DE DESINFECTAR**



\* Realizar extracciones a través de **catéter SOLO** cuando hay **sospecha de bacteriemia relacionada con catéter**, enviando además la extracción por punción periférica identificando cada una en el frasco de hemocultivos.

## 4.- EXTRACCIÓN SERIADA DE HEMOCULTIVOS SIEMPRE QUE SEA POSIBLE



Se recomienda la extracción de al menos dos botellas de hemocultivos siempre que sea posible.