

RECOMENDACIONES DE MANIPULACIÓN EN DOMICILIO DE:

Al administrar algunos medicamentos, por sus características estructurales y por la actividad que ejercen, es recomendable que el manipulador utilice algún tipo de protección para evitar entrar en contacto directo con ellos.

Estos medicamentos pertenecen a distintos grupos terapéuticos como por ejemplo fármacos para el tratamiento de enfermedades oncológicas, algunos antiepilépticos, inmunosupresores...

La protección se aplicará a diferentes grupos de personas en función del medicamento que le hayan prescrito:

- Todos los manipuladores
- Sólo a aquellas personas que estén intentando concebir en la actualidad, embarazo y/o lactancia.

RECOMENDACIONES DE MANIPULACIÓN

- Lávese las manos antes y después de la manipulación del medicamento.
- Utilice guantes y mascarilla cuando sea necesario.

| FORMA FARMACÉUTICA | GUANTES DE NITRILO Uso único  | MASCARILLA FFP3 Desechar tras un mes de uso  |
|----------------------------------|--|---|
| Cápsula/Comprimido intacto | ✓ | ✗ |
| Cápsula/Comprimido fraccionado | ✓ | ✓ |
| Solución/Suspensión oral | ✓ | ✓ |
| Formas tópicas | ✓ | ✓ |
| Inyección subcutánea | ✓ | ✓ |
| Polvo/Suspensión para inhalación | ✓ | ✓ |

Solicite las mascarillas en su centro de salud.

RECOMENDACIONES DE MANIPULACIÓN EN DOMICILIO DE:

Al administrar algunos medicamentos, por sus características estructurales y por la actividad que ejercen, es recomendable que el manipulador utilice algún tipo de protección para evitar entrar en contacto directo con ellos.

Estos medicamentos pertenecen a distintos grupos terapéuticos como por ejemplo fármacos para el tratamiento de enfermedades oncológicas, algunos antiepilépticos, inmunosupresores...

La protección se aplicará a diferentes grupos de personas en función del medicamento que le hayan prescrito:

- Todos los manipuladores
- Sólo a aquellas personas que estén intentando concebir en la actualidad, embarazo y/o lactancia.

RECOMENDACIONES DE MANIPULACIÓN

- Lávese las manos antes y después de la manipulación del medicamento.
- Utilice guantes y mascarilla cuando sea necesario

| FORMA FARMACÉUTICA | GUANTES DE NITRILLO Uso único  | MASCARILLA FFP3 Desechar tras un mes de uso  |
|----------------------------------|---|---|
| Cápsula/Comprimido intacto | ✓ | ✗ |
| Cápsula/Comprimido fraccionado | ✓ | ✓ |
| Solución/Suspensión oral | ✓ | ✓ |
| Formas tópicas | ✓ | ✓ |
| Inyección subcutánea | ✓ | ✓ |
| Polvo/Suspensión para inhalación | ✓ | ✓ |


Solicite las mascarillas en su centro de salud.

3. No tire el medicamento por el desagüe ni a la basura.

| MEDICAMENTOS Y MATERIAL | LUGAR DE DESECHO |
|--|---|
| Fórmulas magistrales y material contaminado | Deséchelo en un bote cerrado y una vez lleno, llévelo a la farmacia del hospital. |
| Medicamentos comerciales | Punto SIGRE |
| Guantes, jeringas limpias y material de limpieza | Deposite en una bolsa cerrada y deséchela en un Punto Limpio. |

4. Lave las jeringas con agua y jabón varias veces y déjelas secar.

5. Retírese los guantes de la siguiente manera:



PRECAUCIONES



1. En caso de vómito y/o derrame, utilice guantes y papel de cocina para recogerlo y limpie la zona con abundante agua y jabón. Los materiales utilizados hay que desecharlos en el mismo lugar que el material de preparación.
2. En caso de salpicadura en los ojos, lávese con suero o agua durante 10 minutos.
3. En caso de salpicadura en la piel, lávese con agua y jabón durante 5 minutos.

CONTACTO
HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS
SERVICIO DE FARMACIA

Avda. Menéndez Pelayo, 65, 28009, Madrid.

91 503 59 00 Extensión: 491

farmac.hnjs@salud.madrid.org

Horario de atención:

De lunes a viernes de 8.30 h a 14.30 h




3. No tire el medicamento por el desagüe ni a la basura.

| MEDICAMENTOS Y MATERIAL | LUGAR DE DESECHO |
|--|---|
| Fórmulas magistrales y material contaminado | Deséchelo en un bote cerrado y una vez lleno, llévelo a la farmacia del hospital. |
| Medicamentos comerciales | Punto SIGRE |
| Guantes, jeringas limpias y material de limpieza | Deposite en una bolsa cerrada y deséchela en un punto limpio. |

4. Lave las jeringas con agua y jabón varias veces y déjelas secar.

5. Retire los guantes de la siguiente manera:



PRECAUCIONES



1. En caso de vómito y/o derrame, utilice guantes y papel de cocina para recogerlo y limpie la zona con abundante agua y jabón. Los materiales utilizados hay que desecharlos en el mismo lugar que el material de preparación.
2. En caso de salpicadura en los ojos, lávese con suero o agua durante 10 minutos.
3. En caso de salpicadura en la piel, lávese con agua y jabón durante 5 minutos.

CONTACTO HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS SERVICIO DE FARMACIA

Avda. Menéndez Pelayo, 65, 28009, Madrid.
91 503 59 00 Extensión: 491
farmac.hnjs@salud.madrid.org
Horario de atención:
De lunes a viernes de 8.30h a 14.30

