

## INSTRUCCIONES PARA RECOGIDA DE MUESTRA PARA LA DETECCIÓN DE *Enterobius vermicularis* (oxiuros)

### TEST DE MARKEY

Este procedimiento expone las normas de la recogida de muestra para el estudio de parasitación por *Enterobius vermicularis* (*Lombriz de los niños*).

**Material necesario:** solicitar el material al personal de extracciones del Hospital:

- Hisopos impregnados en vaselina y parafina (4:1)

**Preparación previa del paciente:** Previamente a la toma de muestra, **no debe lavarse la zona alrededor del ano.**

**Procedimiento de recogida de la muestra:** A primera hora de la mañana, antes del aseo personal, pasar el hisopo suavemente por el margen anal para adherir los posibles huevos del parásito. No introducir el hisopo dentro del ano. Una vez realizada la toma, insertar de nuevo el hisopo en su contenedor. Se recomienda que la persona que realiza la toma se lave las manos inmediatamente ya que los huevos son infectivos incluso a las 4-6 horas de la puesta.



- Identifique el hisopo con el nombre y apellidos del paciente.

Si está tomando antibióticos o ha iniciado el tratamiento con alguno de ellos, informe al personal del laboratorio.

No dude consultar en el Centro cualquier información adicional que necesite.

Horario de entrega de la muestra al laboratorio (área de extracciones):

Lunes - viernes de 8:00 a 14:00 horas



Nombre	Comunicación de recogida de Urocultivo (Micción)_Ver 1	Código	ACL-AX-208
Aprobado	Jefe Servicio/ Sección/ Unidad	Edición	D
Fecha	Febrero 2025	Página	1 de 2



Nombre	Comunicación de recogida de Urocultivo (Micción)_Ver 1	Código	ACL-AX-208
Aprobado	Jefe Servicio/ Sección/ Unidad	Edición	D
Fecha	Febrero 2025	Página	2 de 2