

## DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA (DSE)


Se trata de una de las técnicas preferidas para la extirpación de pólipos esofágicos o gástricos. También es la más indicada para extirpar pólipos del colon, especialmente cuando su aspecto pueda indicar que tienen riesgo de albergar focos de cáncer o cuando presentan gran tamaño o están en zonas de accesibilidad muy difícil. La ventaja que tiene esta intervención es que nos permite extirpar la lesión en una sola pieza, independientemente de cuanto mida.

Esta intervención no se realiza en todos los centros dada la gran dificultad técnica que implica y el difícil aprendizaje para los médicos que la tienen que ejecutar. En este sentido cabe destacar que nuestro centro es uno de los que más experiencia ha acumulado a nivel europeo desde su implantación en 2012.


El fundamento de la disección submucosa endoscópica es la separación de las capas superficiales donde está localizada la lesión del resto de la pared profunda, de tal manera que se extirpe en bloque sin perforar la víscera o el órgano. Para ello se utilizan instrumentos llamados bisturís de disección.




1) Incisión inicial borde



2) Fase inicial de disección




3) Fase intermedia de disección



4) Fase final de disección

*Fases de la disección submucosa endoscópica (DSE)*



*Ejemplo de lesión de 6cm en colon sigmoide extirpada en una sola pieza mediante Disección Submucosa Endoscópica*