

Protocolo de vaciamiento gástrico

INDICACIONES

- Valoración del retraso (gastroparesia) y/o aceleración del vaciamiento gástrico a sólidos

CONTRAINDICACIONES

- Embarazo
- En caso de lactancia se suspenderá un mínimo de 24 horas post-exploración.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE

- Ayuno de 8 horas (desde la media noche previa)
- No fumar 8 horas antes a la prueba.
- Control de la glucemia: no debe realizarse el estudio con cifras de glucemia > 275 mg/dL
- Retirar la medicación que interfiere 48 hs antes:
 - Procinéticos: metoclopramida (primperam), domperidona (motilium), y levosulpiride (pausedal , levogastrol), eritromicina.
 - Opiáceos, anticolinérgicos, antidepressivos tricíclicos, laxantes.
 - Antiácidos tipo almax o gaviscon, IBP (omeprazol y derivados), y famotidina/ranitidina.
 - Otros medicamentos que deben suspenderse: antagonistas de los canales de calcio, benzodiacepinas, progesterona, octeótride
- Los **diabéticos** deben **traer su insulina** y se pondrán mitad de la dosis de la mañana al tomar “la comida que se le dará para la prueba”
- Se ha de advertir al paciente que mientras dura la prueba no puede tomar ni líquidos ni sólidos, tampoco podrá fumar . No debe dar grandes paseos ni subir/bajar escaleras y no debe tumbarse. Permanecerá en la sala de espera de medicina nuclear