

Recuerde:

- Traer su **tarjeta sanitaria**.
- Traer su **D.N.I.**
- Venir con **ropa cómoda**.
- **No venir maquillada, ni con uñas postizas, ni esmalte de uñas.**
- **No venir con joyas, objetos metálicos, piercing.**
- Traer todos los **informes médicos**.
- **Informar de sus alergias.**
- Venir a la **hora acordada**.
- **Venir acompañada/o** de un adulto responsable.
- **Tener organizada su vuelta a casa**, en el caso de que su cirugía no precise ingreso.
- **Leer y seguir las indicaciones del folleto de Instrucciones para el Paciente Quirúrgico**, que se le entregará en el Área de Consultas.

*Si desconoce las necesidades que pueden surgirle tras la intervención, tiene imposibilidad de acudir acompañado a la cirugía o de recibir cuidados durante el postoperatorio, debe comunicárselo al médico responsable o contactar con nuestra **Unidad de Trabajo Social**. Tlf.: 91 557.43.72/45.07*

La atención social en estos casos aumenta las posibilidades de éxito de la intervención, reduce posibles complicaciones y hace más sostenible la sanidad pública.

Contacta con nosotros:

 C/ Maestro Vives 2-3, 28009 MADRID

 Teléf.: 91 557 43 00
Fax: 91 557 44 00

Teléfono Secretaría Servicio:
91 557 43 56 / 91 557 43 54

 <https://www.comunidad.madrid/hospital/santacristina/ciudadanos/cirugia-general-digestivo>



Escanéame



*Lo que usted
debe saber*

¿Qué es una fisura anal?

Es un **desgarro longitudinal de la mucosa de la porción final del canal anal**. Su localización más frecuente es en la parte posterior del orificio anal.




¿Dónde se puede realizar la intervención?

Esta cirugía se realiza en un hospital dotado de la adecuada tecnología y con todas las **garantías de seguridad que dicha intervención exige**.

¿Cómo se manifiesta?

- El síntoma más relevante es el **dolor anal** intenso en relación con la deposición y que habitualmente se acompaña de un pequeño sangrado (suele impregnar el papel higiénico al limpiarse).
- **Picor anal**.
- **Secreción mucosa**.



Ano

Fisura Ano

¿Qué tipo de anestesia se utiliza?

Generalmente el procedimiento anestésico será **anestesia raquídea o general**. La técnica anestésica a utilizar **dependerá** de las **recomendaciones** que le realice su **anestesiólogo y cirujano**.

¿Cuáles son los riesgos de esta intervención?

- **Sangrado** después de la cirugía, habitualmente leve, que no suele precisar ningún tratamiento.
- **Incontinencia habitualmente para gases**, aunque en algunas ocasiones puede producir manchado heces.
- **Persistencia de la fisura**.

¿Cómo se diagnostica?

La simple **inspección anal** permite realizar el diagnóstico, si bien en ocasiones debido a la dificultad para separar el ano por el dolor puede resultar difícil su visualización.

Opciones de tratamiento

El tratamiento médico con pomadas, laxantes y cuidados higiénico dietéticos es el indicado en las fases iniciales, si el paciente tiene una fisura crónica o no responde al **tratamiento médico estará indicada la intervención quirúrgica, siendo la esfinterotomía (cortar el esfínter anal interno)** quirúrgica la alternativa más utilizada.



Cuidados postoperatorios

- **Esta cirugía suele realizarse sin necesidad de ingreso hospitalario**.
- **Los cuidados higiénicos son importantes para conseguir una rápida cicatrización**.
- Con el fin de conseguir una adecuada y rápida recuperación postoperatoria deberá **seguir las instrucciones postoperatorias pautadas por su cirujano**.