

TEST DE TRH

- Deberá acudir al Área de EXTRACCIONES del Hospital (Planta Baja-C / Entrada de Consultas Externas).
- **Agradecemos su puntualidad.**
- La duración de la prueba es de aproximadamente **60 minutos**.
- Para asegurar el éxito de la prueba siga las siguientes **INSTRUCCIONES** atentamente:

8 horas antes de su cita	<ul style="list-style-type: none">◆ NO comerá o beberá NADA (excepto AGUA).◆ NO FUMARÁ.
Durante la prueba	<ul style="list-style-type: none">◆ No podrá abandonar el área de extracciones.◆ No podrá ingerir ni sólidos ni líquidos.◆ No podrá fumar.

- El paciente hipertenso debe tener la tensión arterial controlada antes de realizar la prueba.
- Le pesarán (niños) y le canalizarán una vía venosa heparinizada, de modo que puedan tomarse las muestras de sangre sin necesidad de pincharlo repetidamente.
- La prueba consiste en una primera extracción de sangre, después de la cual se le suministrará VIA INTRAVENOSA una forma sintética de la hormona liberadora de TSH (TRH).
- A continuación se le extraerán 3 muestras de sangre durante los siguientes 60 minutos (una muestra cada 30 minutos) para medir cómo está funcionando su glándula pituitaria.
- Una vez extraída la última muestra de sangre le será retirada la canalización de su vena y podrá reanudar su vida diaria.
- Durante la prueba puede experimentar los siguientes síntomas: náuseas, vómitos, sabor metálico, cefalea, tenesmo vesical (ganas de orinar), sensación de rubor facial e hipertensión arterial.

En caso de duda contactar con el Servicio de Bioquímica (914818000-ext 428715, 428041) en horario de 8-15 h.

Esperamos que este documento sea de ayuda en su proceso