

**TEST DE UREASA
PRUEBA DE ALIENTO CON UREA MARCADA
(HELICOBACTER PYLORI)**



➤ **Los comprimidos utilizados tienen LACTOSA. Si padece intolerancia la misma, comuníquese a su médico antes de realizar la prueba**

➤ La duración de la prueba es de **30 minutos**.

➤ Deberá estar en **ayuno completo** (sólidos y líquidos) y **sin fumar** en las **8 horas** anteriores a la prueba

➤ Debe evitar el consumo de los siguientes **Fármacos**:

4 semanas antes	Antibióticos: Amoxicilina, Tetraciclina, Metronidazol, Claritromicina, Doxiciclina, Eritromicina Compuestos de bismuto
-----------------	---

2 semanas antes	Inhibidores de la bomba de protones: Omeprazol, Pantoprazol, Lansoprazol Antagonistas de los receptores H2 – Histamina (*): Cimetidina, Famotidina, Ranitidina
-----------------	---

24 horas antes	Antiácidos (bicarbonato)
----------------	--------------------------

12 horas antes	Preparados con Bario (Contraste Rx)
----------------	-------------------------------------

(*) Si es preciso, puede mantenerse por orden médica hasta una semana antes. Debe informarse al realizar la prueba.

Si ha tomado alguno de los fármacos anteriores, por indicación de su médico, debe advertirlo para valorar si se puede realizar la prueba o no. En cualquier caso debe apuntarse el nombre del fármaco que ha tomado en el volante.

Acudirá el día de su cita al punto de realización de la prueba en el lugar que se le haya indicado:

- Hospital Severo Ochoa: Avda. Orellana s.n., Leganés). Sala de Extracciones-Planta Baja - C/ Entrada de Consultas Externas
- Centro de Especialidades M^a Ángeles López Gómez (C/ M Ángeles López Gómez s/n, Leganés); 2^a planta, Sala 215 - Digestivo.
- En otro punto especificado (Hospital José Germain; Centro de Salud correspondiente, etc.).

En caso de duda contactar con el Servicio de Bioquímica (914818000-ext 428568, 428387, 890070) en horario de 8-15 h.

Esperamos que este documento sea de ayuda en su proceso