

Zona principal de su cultivo, caracteres generales, sinonimia, etc. Variedad negra, cultivada en esta provincia de preferencia en el término de Guadix. Se la conoce también con el nombre de Melonera. Conjunto foliar muy típico, todo acoquillado o acigarrado como Rupestris Brignais, en esas hojas grandes, de verde oscuro limpio arriba y abajo, de grandes lóbulos. Algunas se hacen carminosas.

Vigor Mucho.

Brote

(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas).

Capullo Verdoso, un poco blanquecino por el peloso arañoso que tiene, y aplastado en extremo ramos.

Primeras hojitas Con ligero arañoso en envés y cara superior a granate (característico).

Sarmientos

Madera, etc. (Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas)

Madera carminada muy listada con rayas carmín, de ramos de muchos ramillos rojizos que le da aspecto espinoso. Varas gruesas acodadas, de un rojo claro, de marcadas rojas listillas; estriosa, fina, limpia, no asperosa. Largos entrenudos. Yemas gordas cerrando escama. Sarmientos pocos, tendidos, cortos, blancuzcos con tinte rosa en parte superior.

Zarcillos Trifurcados, fuertes, a vinosos así como los ramos (característico y particular distintivo de esta variedad). (Verde y lampiña de hojas)

Hojas

Hojas ^{Poco} grandes / Quinquelobadas / casi enteras, lustrosa y lampiña cara superior, y así la inferior; dientes cortos, grandes. Característico el acoquillado o abarquillado de bordes hacia arriba de esas hojas grandes; algunas hacen como cucuruchos acigarrados de tanto como es. Nervaduras en envés, duras y lisas color caña, muy marcadas.

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo) Atablillados, en ángulo casi recto con la hoja, larguísimos, rojizo-carmin destacado.

Seno peciolar En V abierta.

Flor

Epoca de vendimia Tardía.

Fruto


Racimos Grandes, ~~mas~~ (redondeados) o ensanchado de alas colgantes apretadas que lo redoendea. Fino escobajo a rojizo. Granos negros con rayas grises del ápice a la base (no persistente si se limpia la pruina), tipo Valencí Negro, ^{Redondo} tipo Barco, pedúnculo leñoso, largo. Uvas duras, gordas como guindas. Rodete abultado, anillo sin señalar. Pepitas dicelos largos, ^{filas} no verrugosos, verdosos. Tienen de una a tres pepitas, generalmente. Raspon tiende violeta vinoso de desgranar

Observaciones (?) amarilla caña l. luego vinosos. (Hez) Típico.

Defoliación verde amarillento con negruzcas pecas R. Martín.

(Es el Zúcaro Mexava y Bugel de Ext-oriental Valencia).

110



Neptra rayada

Fig. 52.

- Hoja y envés -



Neptra rayada
(1513)

Granada