

Zona principal de su cultivo, caracteres generales, sinonimia, etc.- Es una de cepas mas típicas de esta Región, es tinta, y con Caiño, de las más antiguas. Se le llama Tintilla o Tintón y es el Syrah de otras Regiones (Francia, etc.) (Ver descripción de éste aparte). Parece ser originaria de Per-

Sinonimia sia y muy cultivada por la finura de su uva y la muy buena calidad del vino. Resiste bastante bien la podredumbre (lluvias de otoño. Es uva de lo mas temprana y dulce y buena. Con el Caiño forma una mezcla muy buena, pues aquel le da acidez y ésta (Brancellao) dulzor, y (a)

Vigor Cepa vigorosa, tronco grueso, erguida.

Brote

(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas) etc

Capullo Brota tarde, por lo que resiste bien las heladas; capullo verdoso grisáceo con solo auréola rosa, -acumines verdosos, gruesos con un ligero peloso blancuzco.

Primeras hojitas De borde rosa alrededor limbo, blanco envés gamuza, y en cara superior se marca amarillento oro tipo Cariñena muy característico. Ligero pelo blanco en extremo ramos.

Agostado

y espido

Ramos largos un poco vinosos, color marrón claro al agostamiento entremudos largos, finos y estriados, cilíndricos que se ponen vinosos.

Esas Madera dura, descorteza a láminas estriadas; poca medula; nudos poco salientes; sarmientos jóvenes verdosos claros.

Madera, etc.

Sarmientos (Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas).

Zarcillos Bifurcados rizados, muchas veces no llegan al agostamiento secándose antes.

Hojas (grandes) (forma y dimensión) Hojas de tamaño medio, algas apergamina das, quinquilobadas y un poco replegadas en los bordes; color verde en cara superior normal, y en la inferior más pálido con un ligero pelo arañoso en pequeños flocos y sobre los nervios (fiel-trosos Bobal). Dientes cortos en dos series, anchos u obtusos es lo general.

Variables forma

Hojas

(Aspecto general del conjunto del foliaje, época de caída de las hojas y color que toman en el otoño).

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo) Largos, de color púrpura-violáceo, formando ángulo obtuso con limbo.

Seno peciolar Profundo y a menudo se superponen los lóbulos.

Flor

(Época de floración y caracteres de la flor)

Época de vendimia Es de madurez de 1ª época como el Cabernet-Sauvignon.

Racimos Medios, largos, cilíndricos, cónicos en general no muy apretados los granos, ahorquillado y mucho en los racimillos (un poco alado) De preferencia en los ramos lejos del origen. Pe-

Fruto

Granos (dúnculo largo, fuerte.- Granos medios o pequeños un poco ovoides, desiguales o iguales de grosor, negros con pruiné azulado señalado, sueltos o apretados, de preferencia lo primero. Pe-

Pepitas (díceselos largos, mas delgados en la inserción del eje que en estremo, que se ponen vinosos y ve como mínimo. (rugoso como anillo poco destacado; granos resis-

Observaciones generales. (tentes como hemos dicho. Muy azucarado jugo.

Defoliación en salpicados azulados; en bordes hojas quedan vinoso carminoso, y es lo solo que denota es tinta. Es decir, no defoliación que marque conjunto vinoso.

Requiere esta planta una poda larga, sobre todo al principio.

(Ver Provincia Pontevedra p. 2 completo).

Cepa VARIEDAD BRANCELLO, O BRAZEIDURO
O BRANCELLO

Zona principal de su cultivo. caracteres generales. sinonimia, etc.-

(a) así esas proporciones de mezcla ya señaladas al describir el Caiño dan los buenos vinos del Miño. 1/3 Brancellao y 2/3 de Caiño dan el buen vino del Miño, se dice; e igualmente es de señalar la mezcla

Sinonimia (de Brancellao, Pazao y Caiño para los vinos del Rivero.
(Es variedad a la que ataca el Oidium mucho, pero se la defien-
(de muy bien con azufre. Injertada sobre portainjertos a base de
(Riparia va muy bien. Produce muy bien en terrenos sueltos y sa-
(nos con buena exposición, y los caldos son alcohólicos, como he-
(mos dicho y no coloreados.
(Conjunto foliar al entero lo general, quinquilobado o trilobado

Vigor

Capullo (de hojas grandes abundantes recubiertas de un ligero
(pelo arañosos en la cara inferior, sobre todo en las ner-
(vaduras. En otoño se colorean en amarillento con manchas

Primeras hojitas (de color rojizo vinoso muy marcado. El racimo y el
(fruto es a tipo Burdeos y de calidad. (Cabernet)

Brote
(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas)

Agostados

Tiernos

Zarcillos

Hojas grandes (forma y dimensión)

Hojas pequeñas (forma y dimensión)

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)

Seno peciolar

Epoca de vendimia

Racimos

Granos

Pepitas

Sarmientos
Madera, etc
(Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas)

Hojas
(Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y coloración que toman en el otoño)

Flor
(época de floración y caracteres de la flor)

Fruto

Observaciones generales.



"BRAZEIDURA"

Y hayloja ma' labulda



"BRAZEIDURA"

Zona principal de su cultivo , caracteres generales, sinonimia, etc.-

Sinonimia

Ya hemos descrito esta cepa en la provincia de Orense. Por eso, solo añadiremos aquí algún detalle que complete aquella descripción.

Vigor

Es cepa portuguesa, conocida desde el siglo XVIII por Lacerda Lobo como

Brote

Capullo

existente en Vilanova de Cerveira (Minho); todavía hoy ocupa lugar importante en Caminha (Miño) donde da vinos "rosádu- El Brencelho tinto local" es también cepa del Miño con ciertas analogías al Alvarelhao.

(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas)

Primeras hojitas

Agostados

De esta cepa provienen los renombrados vinos de Amandi, Peares y otros, incluso el Tostado apesar de ser tinto.

Madera, etc.

Sarmientos (Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas)

Tiernos

Cepa que va muy bien en terrenos pobres (pizarrosos y graníticos) de exposición meridional, en los que produce vinos muy finos y alcohólicos propios para mezclas.

Zarcillos

Es muy sensible al oidium. Hay una subvariedad llamada Ferrapal, porque en cada racimo de uva los granos son de tamaño diferentes una vez maduros, y además son redondos, mientras que en la variedad corriente son algo ovoides. Esta subvariedad es mas sabrosa y se corre mucho sobre patrón americano.

Hojas grandes (forma y dimensión)

Hojas

(Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y coloración que toman en el otoño)

Hojas pequeñas (forma y dimensión)

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)

Seno peciolar

Flor

(Epoca de floración y caracteres de la flor)

Epoca de vendimia

Racimos

Fruto

Granos

Pepitas

Observaciones generales.



Ponlevedra - Brazeiduro o Bressella -



*Brazeiduro
(1239)*