

Zona principal de su cultivo

Sinonimia Ver descripción en Provincia de Pontevedra (como Albillo) y de Asturias.

Vigor Variedad blanca. Hay Albariño Blanco y Negro en Asturias, que le asemeja en algunos caracteres, pero no todos, ni en hojas.

Brote (Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas) .... Capullo Primeras hojitas

Agostados

Sarmientos (Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas) ..... Tiernos

Zarcillos

Hojas (Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y coloración que toman en el otoño) .... Hojas grandes (forma y dimensión) Hojas pequeñas (forma y dimensión)

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)

Seno peciolar

Flor (Epoca de floración y caracteres de la flor).


Fruto Epoca de vendimia Racimos

Granos

Pepitas

Observaciones generales:







Zona principal de su cultivo, caracteres generales, sinonimia, etc.-

**Sinonimia**

**Vigor**

**Brote**

(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas)

Capullo

Primeras hojitas

Agostados

**Sarmientos**

**Madera, etc.**  
(Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas)

Tiernos

Zarcillos

Hojas grandes (forma y dimensión)

**Hojas**

(Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y coloración que toman en el otoño)

Hojas pequeñas (forma y dimensión)

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)

Seno peciolar

**Flor**

(Epoca de floración y caracteres de la flor)

Epoca de vendimia

Racimos

**Fruto**

Granos

Pepitas

Solo diremos aquí algunas palabras que completen la descripción hecha de esta notabilísima variedad, típica aquí igual; tinta (Caiño, el Rey del Vino) en la provincia de Orense (y sus dos subvariedades).

Es muy característico en ella el prensado de las hojas que las hacen como placas de tanto que a veces montan los lóbulos peciolares, dando hojas casi redondas, y esas hojas de limbos planos dan bien al entero o trilobado triangular de un Aramón. Su follaje es rugoso.

En los racimos a veces quedan algunos granillos verdosos tardíos, y esto es una particularidad a señalar. Se ahorquillan y salen dos unidos.

Apesar de la calidad que da a los vinos, la poca afinidad a los patrones americanos y la producción no muy grande, hacen que no se siga extendiendo y se reduzca algo su cultivo.

Es variedad que brota temprano.

Parece el Espadeiro largo, indígena del país.- Requiere poda larga.

**Observaciones generales.**



*Panleyda- Caiño-*



*Caiño-*  
(1949)



Zona principal de su cultivo, caracteres generales, sinonimia, etc.-

Cepa de las bien diferenciadas, cultivada igualmente en Coruña y Asturias (ver descripciones) y en Portugal en la Región del Miño (ver descripción también allí completa). La llaman Caiño blanco igualmente.

**Sinonimia** El conjunto foliar es al entero, no muy fino, quizás algo rugoso, con la cara inferior de las hojas blanquinosa verdosa (Xarello), dentado redondeado y limbos planos. Es el Verdello Blanco o un Xarello gallego, o Caiño blanco. Da grado.

**Vigor** Regular. Porte medio. Es delgada cepa. Descorteza a tiras.

**Brote**

(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas).

**Capullo** Brote rosa vivo, blanco, de dorado borroso extremo ramo rosa (como palomitas blancas), y así las primeras hojitas, pelo- (sas, de envés blanco. Brota como a fin de marzo.

**Primeras hojitas**

**Agostadas** Varas medias, con peloso lanoso vinoso al 41-B algunas, y zarcillosas; algo acodadas. Madera rojiza, pero no muy ramificadas varas.- Entrenudos medios, delgados, de estriosa madera y fina. Nudos aplanados y poco salientes. Yemas gordas, redondas, **Tierras** no muy grandes.

**Sarmientos**  
(Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas).

**Zarcillos** Trifurcados lo general, rizosos y fuertes.

**Hojas**

(Aspecto general del conjunto del folio, época de caída de las hojas y coloración que toman en el otoño).

**Hojas grandes** (forma y dimensión) Son pequeñas, rugosas, algo más anchas que largas, con los senos superiores algo marcados, y los inferiores apenas, al tipo entero o trilobado. Haz glabro y envés poco tormentoso. Dientes en sierra, agudos, nervios poco salientes. Envés de pelo borroso a paño raído. Dentado redondeado.

**Hojas pequeñas** (forma y dimensión)

**Peciolos** (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo) Carminados, perpendiculares a limbo, medianos.

**Seno peciolar** V. corta abierta, profunda, dando limbos planos, sin superponerse los lóbulos (detalle típico que no da Caiño).

**Flor**

(Época de floración y caracteres de la flor)

**Flor** como la de Verdello (verlo)

**Epoca de vendimia** No tardía.

**Racimos** Son pequeños, forma a Pinot, cilíndricos, alados, ahorquillados en dos racimos pequeños; pedúnculo largo, leñoso, delgado. El raspón torcido y enmarañado como el pelo de una negrita.

**Fruto**

**Granos** Blancos, dorados, muy pequeños, redondos y finos que dorean como Xarello (recuerda a esta variedad), dulce, gustosa, buena para vino. Pedicelos largos, se separan fácil, poco verrugosos; cer-  
**Pepitas** (quillo anillo poco saliente. Uva pruiné, gusto a  
2 a 3 por (muscadillo. Hollejo delgado.  
grano.

**Observaciones generales.** Produce bien esta cepa.- De triscencia amarillenta pardeada.- Hace esta variedad muchos racimillos pequeños. Da grado alcohólico al vino.- Es muy sujeta a enfermedades criptogámicas.- Cepa típica del Valle del Rosal en la ribera del Miño.  
**Nota.**- Ver Pinot b. y Mesnier para analogías.





*Pontevedra - Albariño*



Albariño  
(1237)

Pontevedra