



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

BLANCA SUPERIOR PARRAL

SUMIDAD.- A. globosa, algodonosa, blanca con borde algo carminado, B. - globosa, algodonosa, blanca con puntos carminados.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz velloso, envés algodonoso, - verde amarillo.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés velloso, verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal algo elíptica, contorno con - costillas, parcialmente poco arañoso, parcialmente algunas rayas rojas.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 000110101101101101101100

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagona, media-grande, seno peciolar en U, pentalobulada, seno lateral superior en bordes superpuestos, seno lateral inferior en U, haz glabro, envés velloso, limbo torcido, lobulos algo plegados, angulo del vertice del lobulo terminal recto, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados rectilíneos, de color verde fuerte sin brillo, limbo delgado-medio, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrado.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, medio, pedunculo visible, - semiagostado, longitud relativa 1/7. Ver fotografía.






BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Gruesa, tamaño año irregular, color ambarrino, con poca pruina, coloración irregular, forma ovoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa carnosa, sabor neutro, pedicelo medio de color verde, rodete evidente de color verde, pincel medio de color amarillo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Haz verde con manchas marrones, envés verde.

SARMIENTO.- 167 cm. de largo fuerte, ramificado, corteza adherente, sección transversal elíptica, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 9,9 cm. de color pardo rojizo, casi uniforme, yemas cónicas-dardo.

TRONCO.- Potente.



25 II A I