



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

C I R I A L
=====

SUMIDAD.- A. abierta, afelpada, bordes carminados. B. media, vellosa, - verde blanquecino, puntos carmín.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz vellosa, envés más, dientes glabros, verde amarillento.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Bordes curvados hacia el envés, haz arañoso envés mas, verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sin lenticelas, sección transversal circular, con torno con muchas costillas, arañosos y final casi vellosa, verde con alguna zona bronceada, enteramente.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 001011001101101101101101001101101101101101.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, media, seno peciolar en lira, pentalobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en lira, y parente sis, haz glabro, envés arañoso, haz y envés de 5 nervios arañoso, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal recto, superficie estampada, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verde, dientes de lados rectos, de color verde, con brillo, limbo grueso, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, medio, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, suelto, pedúnculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.


BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Grande, tamaño irregular, color rosa-rojizo, con pruina, coloración irregular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular-circular, zumo incoloro, piel media pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo largo, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel corto, de color verde, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya. 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde-rojo.

SARMIENTO.- 267 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza zonas -- desprendidas, sección transversal circular, irregular, superficie con estrias, parcialmente poca pruina, nudos algo salientes, totalmente -- glabro, entrenudos de longitud media 9,0 cm. de color marrón gris, nudos y rayas más marrones, yemas en dardo.

TRONCO.- Potente.



12-47

