



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

A L B I L L O R E A L  
=====

SUMIDAD.- A. media, afelpada, borde ligeramente carminado. B. media, -  
vellosa, verde blanquecino con puntos carmín.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz vellosa, envés algodonoso,  
verde blanquecino.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés vellosa, ver  
de claro,

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno con muchas  
costillas, muy arañoso, final vellosa, verde muy bronceado, menos al -  
final.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: (2011001101100) 0130011110.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal, grande, seno peciolar en U, pentalobulada, se  
no lateral superior en U y V, seno lateral inferior en parentesis, haz  
arañoso, envés arañoso, haz y envés de 5 nervios arañosos, limbo plano,  
lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal recto, superfi-  
cie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios  
de primer orden sobre el haz verde, dientes de lados convexos con ápi-  
ce amarillo, de color verde, sin brillo, limbo mediano, nervios de or-  
den 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, arañoso, sección poco eviden-  
te.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguida.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, medio, pedúnculo visible, -  
agostado hasta la 1ª ramificación, longitud relativa 1/10. Ver fotogra-  
fía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Grande, tamaño regular, de color verde,  
con pruina, coloración regular, forma casi esférica, ombligo persisten-  
te, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugo-  
sa, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de  
color verde, pincel medio, de color verde, separación difícil. Ver fo-  
tografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 3. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Amarillo.

SARMIENTO.- 179 cm. de largo, fuerte, poco ramificado, corteza se des-  
prende en tiras, sección transversal circular, superficie estriada, -  
sin pruina, nudos aplastados, totalmente glabro, entrenudos de longi-  
tud media 10,5 cm. de color gris claro marrón, a bandas, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	ALBILLO REAL
1.- SUMIDAD	A. media, afelpada, borde ligeramente carminado. B. media, vellosa, verde blanquecino con puntos carmín.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, haz veloso, envés algodonoso, verde blanquecino.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidas, haz arañoso, envés veloso, verde claro.
4.- SARMIENTO HERBA CEO	Sección transversal circular, contorno con muchas costillas, muy arañoso, final veloso, verde muy bronceado, menos al final.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula; 01100110110.
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Pentagonal, grande, seno peciolar en U, pentalobulada, seno lateral superior en U y V, seno lateral inferior en -- parenthesis, haz arañoso, envés arañoso, haz y envés de 5 nervios arañosos, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vertice del lóbulo terminal recto, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verde, dientes de lados convexos don ápice amarillo, de color verde, sin brillo, limbo mediano, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA - HOJA ADULTA	<del>Medio</del> , medio, arañoso, sección poco evidente. LARGO
9.- PORTE DE LA VE- GETACION	Erguida.
10.- RACIMOS CON MA- DURACION INDUS- TRIAL	Medio, medio, pedúnculo visible, agostado hasta la 1ª ramificación, longitud relativa 1/10. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADU- RACION INDUSTRIAL	Grande, tamaño regular, de color verde, con pruina, coloración regular, forma casi esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel medio, de color verde, separación difícil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 3. Ver fotografía.
13.- FOLLAJE EN OTO- ÑO	Amarillo.
14.- SARMIENTO	179 cm. de largo, fuerte, poco ramificado, corteza de desprende en tiras, sección transversal circular, superficie estriada, sin pruina, nudos aplastados, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 10,5 cm. de color gris claro marrón, a bandas, yemas cónicas.
15.- TRONCO	Potente.

Instituto Nacional  
de  
Investigaciones  
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

ALBILLO REAL (CC)

B



OCT • 71

