



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

BALADI
~~V A L E N C I V E R D E J A~~
=====

SUMIDAD.- A. media, afelpada, borde carminado. B. globosa, vellosa, dientes glabros y verdes, blanco, verdoso, punto carmín.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz vellosa, envés algodonoso, dientes glabros, verde blanquecino.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Curvadas al envés, haz arañoso, envés algodonoso, verde amarillento.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno arañoso y final vellosa, verde enteramente.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 001101101011010011011.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Cuneorbicular, mediana, seno peciolar en parentesis, pentalobulada, seno lateral superior en lira ó bordes superpuestos, seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés arañoso, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos algunos torcidos, ángulo del vértice del lóbulo terminal agudo, recto ú obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés amarillentos, nervios de primer orden sobre el haz verde, claro, dientes de lados convexos, de color verde oscuro, con brillo, limbo medio, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- No muy erguida.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, medio, pedúnculo visible, herbáceo, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Grande, tamaño irregular, color verde ambarrino, con pruina, coloración regular, forma casi esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa crujiente, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente de color verde, pincel corto, de color verde, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 1. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde amarillento.

SARMIENTO.- 148 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza poco despreñida, sección transversal circular-irregular, superficie con estrias poca pruina, nudos aplastados, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 8,2 cm. de color marrón, rayas algo amarillas, yemas redondeadas - apuntadas.

TRONCO.- Potente.



10 30

