



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

B L A N C A G O R D A L  
=====

SUMIDAD.- A. media, lanosa-algodonosa, ribete carminado. B. media, arañosa, casi algodonosa, blanca con bordes verdes.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Desplegadas, lanosa-yelosa, verdes.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, arañosa, verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal elíptica, contorno liso, parcialmente arañoso, enteramente verde.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 000001011011010001011001000

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, mediana, seno peciolar en parentesis, pentalo bulada, seno lateral superior en parentesis, seno lateral inferior en v, haz glabro, envés arañoso, con 5 nervios, limbo algo plegado, lobulo algo torcido, angulo del vertice del lobulo terminal agudo, superficie con ampollas, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados convexos, de color verde oscuro sin brillo, limbo grueso, nervios de orden 5º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DEHOJA ADULTA.- Medio, grueso, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACIÓN.- Postrado.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, medio, con pedunculo visible, agosotado hasta la primera ramificación, longitud relativa 1/5. - Ver fotografía.



BAYA CON MADURACION INDUSTRIAL.- Muy gruesa, tamaño irregular, de color amarillo, con pruina, coloración irregular, forma esferica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel medio, de color verde, separación difícil, Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya, 3. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTONO.- Muchas zonas marrones oscuras, sobre fondo verdoso, pedicelo rojo oscuro en casi su totalidad.

SARMIENTO.- 200 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, la corteza se desprende a tiras, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 7,6 cm., de color beige pálido con rayas oscuras, yemas en dardo.

TRONCO.- Potente.



25 III B 1