



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

LISTA N  
=====

SUMIDAD.- A. abierta, arañosa, verde, bordes carminados. B. media, vellosa, verde claro borde carminado.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz y envés afelpado, borde glabro, verde blanco, borde rojizo.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendida, haz arañoso, envés afelpado, verde ligeramente cobrizo.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal cuadrangular-irregular, con tornos con costillas, arañoso, más zona terminal, verde con zonas y rayas rojas.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 0011011011011011011000010110110.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, mediana, seno peciolar con bordes superpuestos, pentalobulada, seno lateral superior en lira ó con bordes superpuestos, seno lateral inferior en lira, haz algo arañoso, envés bastante arañoso, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos torcidos, ángulo del vertice del lóbulo terminal obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados convexos ó rectilíneos, de color verde oscuro, poco brillo, limbo grueso, nervios de orden 4º no salientes.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, ligeramente acerdado, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medianas y grandes, sueltos, pedúnculo visible, algo agostado hasta la 1ª ramificación, longitud relativa 1/5 ó 1/6.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Grande, tamaño irregular, color ambarino, algo de pruina, coloración irregular, forma esferoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa carnosa, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente de color verde, pincel medio, de color amarillo, separación regular. - Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde.

SARMIENTO.- 145 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza algo desprendida, sección transversal circular, superficie estriada, sin pruina, nudos aplastados poco salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 8,6 cm. de color gris-amarillento, regular, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	L I S T A N
1.- SUMIDAD	A. abierta, arañosa, verde, bordes carminados. B. - media, vellosa, verde claro borde carminado.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, haz y envés afelpado, borde glabro, verde blanco, borde rojizo.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendida, haz arañoso, envés afelpado, verde ligeramente cobrizo.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sección transversal cuadrangular-irregular, contorno con costillas, arañoso, más zona terminal, verde con zonas y rayas rojas.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula: 0011011011011011011000010110110.
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	<del>Cilicilar</del> <sup>Pentagonal</sup> , mediana, seno peciolar con bordes superpuestos, pentalobulda, seno lateral superior en lira ó con bordes superpuestos, seno lateral inferior en lira, haz algo arañoso, envés bastante arañoso, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos torcidos, ángulo del vertice del lóbulo terminal obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados convexos ó rectilíneos, de color verde oscuro, poco brillo, limbo grueso, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Corto, medio, ligeramente acerdado, sección poco evidente.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Postrada.
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Medianas, y grandes, sueltos, pedúnculo visible, algo agostado hasta la 1ª ramificación, longitud relativa 1/5. ó 1/6.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Grande, tamaño irregular, color ambarino, algo de pruina, coloración irregular, forma esferoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa carnosa, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel medio, de color amarillo, separación regular. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Verde.
14.- SARMIENTO	145 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza algo desprendida, sección transversal circular, superficie estriada, sin pruina, nudos aplastados, poco salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 8,6 cm. de color gris-amarillento, regular, yemas cónicas.

de medio a grande

15.- TRONCO	CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS Potente.	INSTITUTO NACIONAL
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA	INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
	LISTA	1.- SEMILLA
	Medio, vellosos, verde claro y verde oscuro.	2.- NOTAS JUVENILES SUPERIORES
	Medio, vellosos, verde claro y verde oscuro.	3.- NOTAS JUVENILES INFERIORES
	Medio, vellosos, verde claro y verde oscuro.	4.- BARRIMIENTO BARRIO
	Medio, vellosos, verde claro y verde oscuro.	5.- BARRILLO
	Ver fotografía.	6.- VEDR
	Medio, vellosos, verde claro y verde oscuro. Ver fotografía.	7.- HOJA ADUNA
	Medio, vellosos, verde claro y verde oscuro.	8.- BOCILLO DE LA HOJA ADUNA
	Medio, vellosos, verde claro y verde oscuro.	9.- BOCILLO DE LA VEGETACION
	Medio, vellosos, verde claro y verde oscuro. Ver fotografía.	10.- BARRIMIENTO INDUSTRIAL
	Medio, vellosos, verde claro y verde oscuro. Ver fotografía.	11.- HOJA CON MARRAS INDUSTRIAL
	Medio, vellosos, verde claro y verde oscuro. Ver fotografía.	12.- SEMILLA
	Medio, vellosos, verde claro y verde oscuro.	13.- BOCILLO DE OTONO
	Medio, vellosos, verde claro y verde oscuro. Ver fotografía.	14.- BARRIMIENTO


12-10

Instituto Nacional  
de  
Investigaciones  
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

LISTAN



FEB • 72 •

