



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

VERDEJO BLANCO
=====

SUMIDAD.- A. globosa, vellosa, verde claro con manchas carminadas. B. - abierta, arañosa, verde con bordes rojos.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Lóbulos doblados hacia el envés, haz muy arañoso, envés arañoso, rojizas con bordes y nervios verdes.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz y envés ligeramente arañosos, verdes rojizas.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno con costillas, enteramente glabro, enteramente verde con algunas rayas rojizas.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 00110110110011011011011

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular algo irregular, media, seno peciolar en lira abierta o U, pentalobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en V, algunas en lira, haz glabro, envés glabro con los nervios acerdados, con 5 nervios, limbo algo torcido, lóbulos torcidos, angulo del vertice del lóbulo terminal obtuso, superficie algo estampada, nervios de primer orden sobre el envés y haz verde claro con zonas rojizas, dientes de lados convexos y convexos-concavos de color verde oscuro con algo de brillo, limbo grueso, nervios de 5º orden no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, grueso, arañoso, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Pequeño, suelto, pedunculo visible, herbaceo, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Pequeña, tamaño regular, color verde amarillento, con pruina, coloración regular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, sabor neutro, pedicelo medio de color verde, rodete evidente de color verde, pincel corto de color amarillo, separación media. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 1. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Amarillo verdoso con manchas oscuras.

SARMIENTO.- 239 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza adherente, sección transversal aplastada, superficie con estrias, con algo de pruina, nudos salientes, totalmente glabros, entrenudos de longitud media 9,0 cm. de color pardo amarillento con manchas oscuras, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

14 22

