



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

A L B I L L O  
=====

SUMIDAD.- A. globosa, lanosa-algodonosa, blanca con bordes carminados.  
B. globosa, vellosa casi algodonosa, blanca.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Curva hacia el envés, lanosa-leñosa, blanca con bordes algo carminados.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendida, haz glabro, envés acerdado de color verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno liso, parcialmente algo arañoso, totalmente verde.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 0000010001000010101000

FLOR.- Ver fotografía.

HOJAS ADULTAS.- Acorazonada, pequeña, seno peciolar abierto, pentalobulada casi trilobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en v, haz glabro, envés arañoso, limbo plano, lobulos planos, - angulo del vertice del lóbulo terminal agudo, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados convexos, de color verde oscuro sin brillo, limbo no muy delgado, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, delgado, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.... Rastrera.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Pequeño, suelto, con pedunculo visible, herbaceo, longitud relativa 1/5. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño regular, color amarilla, sin pruina, coloración regular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro-dulce, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel medio, de color amarillo, separación fácil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 1. Ver fotografía.





FOLLAJE EN OTONO.- Algo tostado, pero mucha hoja verde, verde pálido algo manchado de tostado.

SARMIENTO.- 125 cm. de largo, debiles, ramificado, corteza algo desprendida, la base, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudps salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 9,5 cm., color beige con manchas, yemas en dardo.

TRONCO.- Potente.

ALBILLO (Cebreros)

B M



25 1 0 9