



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

S U B I R A T P A R E N T  
=====

SUMIDAD.- A. Globosa, vellosa, verde blanquecina con algo carminado. B. globosa, arañosa, verde claro.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Ligeramente doblada hacia el haz sobre el nervio central, haz arañoso, envés afelpado, verde claro, dientes rojos.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, algunas dobladas hacia el haz, haz y envés arañosos, verdes, dientes rojos.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal cuadrangular, contorno con costillas, algo arañoso por la parte superior, enteramente verde con rayas oscuras.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 0110110101101101101101101

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, grande, seno peciolar en lira abierta, pentalobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés arañoso, con 5 nervios, limbo plano lobulos torcidos, angulo del vertice del lobulo terminal obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés y haz verdes, dientes de lados convexos de color verde oscuro con poco brillo, limbo grueso, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, irregular, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrado, algo erguido.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, medio, pedunculo visible, herbaceo, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Pequeña, tamaño regular, color amarillo, con pruina, coloración irregular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor insipido, pedicelo medio de color verde, rodete evidente de color verde más oscuro que el pedicelo, pincel corto de color amarillo con puntos rosas, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde.

SARMIENTO.- 197 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza adherente, superficie estriada, nudos salientes totalmente glabros, entrenudos de longitud media 8,0 cm. de color marrón rojizo irregular, yemas en dardo.

TRONCO.- Potente.

Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas	Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	SUBIRAT PARENT
1.- SUMIDAD	A. Globosa, vellosa, verde blanquecina con algo carminado. B. globosa, arañosa, verde claro.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Ligeramente doblada hacia el haz sobre el nervios central, haz arañoso, envés afelpado, verde claro dientes rojos.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidas, algunas dobladas hacia el haz, haz y envés arañosos, verdes, dientes rojos.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sección transversal cuadrangular, contorno con costillas, algo arañoso por la parte superior, enteramente verde con rayas oscuras.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Formula: 0110110101101101101101
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Orbicular, grande, seno peciolar en lira abierta, pentalobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés arañoso, con 5 nervios, limbo plano lobulos torcidos, angulo del vértice del lobulo terminal obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés y haz verdes, dientes de lados convexos de color verde oscuro con poco brillo, limbo grueso, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Corto, <del>irregular</del> , glabro, sección poco evidente. <i>medio</i>
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Postrado, algo erguido.
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Medio, medio, pedunculo visible, herbaceo, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Pequeña, tamaño regular, color amarillo, con pruina, coloración irregular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor insipido, pedicelo medio de color verde, rodete evidente de color verde más oscuro que el pedicelo, pedicel corto de color amarillo con puntos rosas, separación difícil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.
13.- FOLLAJE EN OTÓN	Verde.
14.- SARMIENTO	197 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza adherente, superficie estriada, nudos salientes totalmente glabros, entrenudos de longitud media 8,0 cm. de color marrón rojizo irregular, yemas en dardo.
15.- TRONCO	Potente.



SEP 4 89



14 35

