



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

X A R E L L O
=====

SUMIDAD.- A. globosa, algodonosa, blanquecina con bordes carminados. B. - globosa, afelpada, blanquecina con puntos carmín.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz velloso, bordes glabros, envés afelpado, verde blanquecino.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz y envés arañosos, verde claro.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal elíptica, contorno con costillas, arañoso en los entrenudos terminales, rojizo con zonas verdes.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 11011001101101101100110110110

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Tronco orbicular cuneiforme, grande, seno peciolar estrecho, casi paralelo o superpuesto, pentalobulada, seno lateral superior en lira o en V, seno lateral inferior en V, haz arañoso, envés muy arañoso, con 5 nervios, limbo plano, lobulos planos, angulo del vertice del lobulo terminal obtuso, superficie rizada en los nervios (algunas), nervios de primer orden sobre el envés y haz verdes con el punto peciolar rosa, dientes de lados convexos de color verde botella con poco brillo, limbo no muy grueso, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, grueso, arañoso, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, compacto, pedunculo visible, - semiagostado, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.



BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño regular, color amarillo, con pruina, coloración regular, forma discoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo corto de color verde, rodete evidente de color verde, pincel corto de color amarillo con puntos rosas. separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde amarillento, amarillo.

SARMIENTO.- 246 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 13,0 cm. de color beige, - la parte al sol grisacea, yemas puntiagudas.

TRONCO.- Potante.



14-38

Instituto Nacional
de
Investigaciones
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

XARELLO



APR • 74

