



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

P A L O T E  
=====

SUMIDAD.- A. de media a globosa, casi algodonosa, blanca con borde carminado, B. globosa, vellosa, blanca verdosa con bordes carminados.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz vellosa, envés algodonoso, blancas verdosas.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Algo dobladas hacia el envés, haz arafioso, envés algo vellosa, verdes.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal algo eliptica, contorno con costillas, parcialmente algo arafioso, parcialmente verde con rayas pardas.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 001011001100110110011011011011001101

FLOR.- Ver fotografia.

HOJA ADULTA.- Pentagonal, media, seno peciolar en parentesis, pentalobula seno lateral superior en parentesis, V, U y lira, seno lateral inferior en V, haz glabro, envés arafioso, con 5 nervios, limbo plano, lóbulos algo torcidos, angulo del vertice del lóbulo terminal obtuso, superficie lisa, algunas algo fruncidas, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz verdes con algunas zonas rojas, dientes de lados rectilíneos de color verde botella con algo de brillo, limbo grueso, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografia.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, grueso, algo arafioso, sección no evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Rastrera.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, medio, pedunculo no visible, semiagostado, longitud relativa 1/7. Ver fotografia.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño regular, color ambarina, con pruina, coloración irregular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo largo de color verde, rodete evidente de color verde, pincel medio de color amarillo, separación difícil. Ver fotografia.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografia.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde con algo amarillo.

SARMIENTO.- 195 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, sección transversal eliptica, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos poco salientes, enteramente glabros, entrenudos de longitud media - 8,0 cm, de color marrón claro con rayas rojizas, yemas cónico-redondeadas.

TRONCO.-Potente.

PALOTE (T)

BV

1503

