

Zona principal de su cultivo caracteres generales, sinonimia, etc.-

Es la cepa, con Sousón, que da mas color a los vinos, color rubí especial, tanto que deja mancha en el vaso, lo que le da gran aprecio, y así los vinos en que esta variedad entra, "peinan" por eso, como allí se dice.

Sinonimia Esta variedad, bien diferenciada, tiene algunas particularidades especiales sobre lo dicho, que señalamos por eso. Con el Sousón son las dos más tintas, y son tintoreras, o sea de pulpa roja. Se la llama tambien Ferral o Ferrán, Negrón o Vinón tinto, y eso debe ser (ver descripción Negrón). Es cepa mediana, poco

Vigor

(cripción Negrón). Es cepa mediana, poco robusta, de corteza adherente y hendida; madera parduzca que se quiebra fácil, por lo que muchas veces se ven sostenidos los brazos por tutores.

Brote

(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas) . . .

Capullo

Primeras hojitas

Los sarmientos no son muy largos, algo acodadas varas, entrenudos medianos, nudos poco salientes, aplanados, en ramificaciones y acodados tambien. Yemas pequeñas, redondas, picudas. Madera zarcillosa.

Agostados

Sarmientos

(Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas). . . .

Tiernos

Hojas medianas o pequeñas, rugosas, mas anchas que largas, enteras o mejor trilobadas; senos inapreciables todos o poco pronunciados los superiores. Cara superior lisa e inferior tormentosa; nervios delgados, poco salientes. Dientes en dos series, agudos.

Zarcillos

Seno peciolar cerrado y profundo.

Peciolos medianos y fuertes, casi perpendiculares a limbo.

Hojas grandes (forma y dimensión)

Racimos medianos o pequeños, piramidales ramificados; maduran desigualmente. Pedúnculo muy largo, verdi-negro.

Hojas

(Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas, y coloración que toman en el otoño). . . .

Hojas pequeñas (forma y dimensión)

Uvas tardías, esféricas, grandes, negras, de pulpa roja, piel gruesa, adherente, sabor acidulado áspero. Da mucho fruto.

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)

Pepitas de 2 a 3 lo general.

Seno peciolar

Detriscencia carminosa (Bouschet).

Brota tarde.

Flor

(Época de floración y caracteres de la flor)

Nota. "Ver Negrón, igual a la descrita tambien, repetimos.

Epoca de vendimia

Es Ferrón del Ribero. Su corteza plomiza simple es típica. Es bueno para dar aspereza a los vinos.

Racimos

Fruto

Granos

Pepitas

Observaciones generales.



Coruña - Espadeiro ~



*Espadeiro Tinto
(1242)*

Zona principal de su cultivo, caracteres generales, sinonimia, etc.-

Ferral, Ferrón o Negrón, o Vinon Tinto, una de las cepas típicas, para muchos igual en todo al Espadeiro Tinto (verlo), pero da distinta hoja. Cepa de las que da mayor coloración al vino, color rubí especial vivo que se distingue de todos los demás (El Sousón es cepa aún más tinta) de ahí el nombre. Los vinos en que entra son los que "peinan" mejor, es decir, que se adhieren mejor a las paredes formando ondas de color rubí cuando se mueven en una taza de uno a otro lado. Es cepa tintorera (a)...

Vigor Mediano, cepa media en todo, de corteza adherente, se quiebra la cepa con facilidad por lo que se la ponen muchos tutores en los brazos.

Brote

(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas)...

Capullo Brota tarde, a fin de abril. Brote rosa vivo, acumines granote.

Primeras hojitas Muy redondeadas o trilobadas, y cara inferior agumizada; ya marcan el rugoso ampolloso que es característico.

Agostados Madera que se pone carminada. Estriosa, áspera y bronca. Se ramifica mucho. Sarmientos medianos, rectos; entrenudos cortos, nudos poco salientes. Yemas pequeñas, redondas. Ramos

Tiempos verdosos de pelos lanosos diseminados.

Sarmientos

Madera, etc.

(Aspecto, color, caracteres de los entrenudos y yemas)...

Zarcillos Trifurcados, grandes y desarrollados como todas las cepas de Galicia.

Hojas

(Aspecto, forma, tamaño, color, etc.)...

Hojas grandes (forma y dimensiones) Medianas, algo rugosas ampollosas, poliformes, mas anchas que largas, unas veces enteras, otras quinquilobadas o trilobadas; senos superiores a veces muy bien marcados,

Hojas pequeñas (forma y dimensiones) otras, todos inapreciables. Haz glabro y envés tomentoso; nervios finos poco salientes; dos series de dientes, agudos, aserrados de Riparia, no muy salientes, o al (b) ...

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo) Medianos y casi perpendiculares a limbo.

Seno peciolar cerrado y profundo.

Flor

(Epoca de floración, aspecto, etc.)...

Epoca de vendimia Tardía.

Racimos Piramidales, algo hombrados o ahoquillados muchas veces, medianos, ramificados; madura desigualmente. Pedúnculo largo leñoso, verdinegro; bastante raspon.

Fruto

Granos Esféricos de unos 15 mm. diametro; muy tintos y negros, apretados; la mayor parte de las veces con la pulpa roja; piel fina, adherente; lágrima rubí, dulce, ácida, algo aspera. Uva Pepitas (muy pruiné; pedicelos poco verrugosos; anillo De 2 a 3. (poco señalado; ambos se avinatan luego.

Observaciones generales.

Da muy buen vino. Detriscencia todo carminado, claro intenso, al carmin de un Bouschet. En lo demás es parecido al Gran Negro. Hay Negral, distinto (ver Leon).

Zona principal de su cultivo, caracteres generales, sinonimia, etc.-

(a).- pues su pulpa es tinta. Su conjunto foliar es poliforme, rugoso, al entero de Aramón en muchas hojas, o de Noah, y blancuzco cara inferior; otras hojas se quinque o triloban (agudas) ya que los senos inferiores apenas se señalan. Dientes agudos en dos series. Cultivada en Bande. Se llama Negrón por lo oscuro que da el vino, como hemos dicho.

(No hay que confundirla con el Gran Negro, ya señalado en Oren-

Brote (Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas).	Capullo	(se, al que se parece, o el Negral, variedad mas redondo elipsoide, casta de Portugués Bleu, de pedúnculos y pedicelos carminados (verlo) que sazona y carga muy bien. Ver tambien Negrón en Asturias, que difiere algo por el medio, más a tipo Negro Blasco, en el que es característico no madurar todo, quedando granillos verdosillos entre los maduros.
	Primeras hojitas	(Se parece algo a Loureiro negro, pero no es, (ver Espadreiro tinto) con las diferencias dichas. Es el Prieto Picudo, Negrón de Asturias o Carrasquín de Asturias. (Uva ácida).
	Agostados	
	Ticados	
Sarmientos Madera, etc. (Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas).	Zarcillos	

Hojas grandes (forma y dimensión) (b).- 1202 . En las hojas de francas, el lobulado es el trilobado bien marcado de lóbulos agudos (apenas quinque).

Hojas pequeñas (forma y dimensión)

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)

Seno peciolar

Flor
(Epoca de floración y caracteres de la flor)

Epoca de vendimia

Racimos

Fruto

Granos

Pepitas

Observaciones generales.



Ponlevedra - Negron -



*Negron
(1249)*

