

(Ver Leon)

Zona principal de su cultivo , caracteres generales. sinonimia, etc.:

Variedad blanca que no es ni Verdejo Blanco (aunque sí algo a él), ni Godello ni a forma de ellos, sino tipo de caracteres propios.(El Agudillo de Asturias es como Tinto Castellano) Conjunto foliar de textura rugosa ~~Sinonima~~ ampollosa, verde claro, mate de Cinerea, de hojas muy grandes a a trilobados redondeado, o quinquilobado bien marcado en las hojas de extremo ramos y que tambien se señalan en las grandes, pero de senos menos hondos. En franca tonos amarillentos. El conjunto es algo al Picapoll (~~Ver id id de Asturias~~)

Cepa vigorosa. Porte erguido.

Brote (Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas) Capullo Blanco-verdoso, de borde rosa parece, pero no lo es pues la coloración viene de los acumines carminosos; en extremo ramo verdoso de peloso de borra pegada en parte, pero dejando ver el verde. Primeras hojitas Blanco gamuza en envés, a trilobadas, y nervaduras verdes, y en cara superior un amarillento como de tostado granatado.

~~Agostados~~
Sarmientos (Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas) Madera, etc. Madera plomiza, y los ramos son gruesos y arqueados en extremo, largos (varas largas), estriados, rojizos, entrenudos largos y estriados de listillas. Madera sana como la de Picapoll, que descor- ~~Tiempos~~ teza a tiras. Yemas de escama cerrada, redondo apuntadas de cabeza borrosa.

Zarcillos Trifurcados, fuertes y rizosos.

Hojas (Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y coloración que toman en el otoño) Hojas grandes (forma y dimensión) Hojas tan anchas como largas, trilobadas o quinquilobadas redondeadas, ha verde claro: Envés blanquinoso fieltroso. Textura rugosa ampollosa, nervaduras amarillentas, marcadas, dos series de dientes.

~~Hojas pequeñas~~ (forma y dimensión) Las hojas pequeñas más marcadas aún.

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo) Verde caña y perpendiculares a limbo; fuertes.

Seno peciolar En V abierta o lira, o formando grandes O al tocarse los lóbulos por un extremo, superpuestos.

Flor (Epoca de floración y caracteres de la flor). Epoca de vendimia Tardía
Racimos Medios, largo-alado, o cilindro-cónico terminado en punta aguda; pedúnculo largo, leñoso. Raspón verdoso.

Fruto Granos Redondo y apretados, pequeños, blanco-verdoso o tostadillo, pero menos dulces y gustosos que Godello o Verdejo; más forma a Picapoll o Agudillo. Da vino ácido y no es por ello variedad la Pepitas (más conveniente al país. Pedicelos delgados, cortos, poco (verrugosos, verdoso, y anillo poco saliente.

Observaciones generales: Es sensible al Oidium y se pudre.
Defoliación amarillenta con manchones negruzcos.
Es variedad que está entre Verdejo y Picapoll.
Es cepa tambien señalada como Portuguesa y de las mas estimadas antiguamente.



Asturias- Agudillo-



Zamora- Agudillo- (distinto)



*Agudillo
(1254)*



*Agudell.
(1858)*