

Zona principal de su cultivo, caracteres generales, sinonimia, etc.

Capa de conjunto foliar rugoso gordo, al entero o trilobado-redondo. Hoja de forma cordiforme, muy general, de varios dientes redondeados poco salientes, así como los lóbulos poco profundos. Cara inferior de las hojas muy blanco de Noah. Es típico el seno peciolar superponiéndose planisimamente los lóbulos.

Vigor

Brote

(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas)

Capullo Brote rosa vivo con capullos así y hojitas blanco gamuza en envés y tonos vinosos cara superior.

Primeras hojitas ✓

~~Agostados~~ Madera rojiza de largas varas rectas, broncas (vara de Verdejo), nudos poco salientes, entrenudos de 10 a 12 cm. Yemas pequeñas. No hay ramificaciones.

Sarmientos

Madera, etc.
(Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas)

Tiernos

Zarcillos

Hojas

(Aspecto general del conjunto de follaje, época de caída de las hojas y coloración que tomarán en el otoño)

~~Hojas grandes~~ (forma y dimensión)

~~Hojas pequeñas~~ (forma y dimensión)

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo) Peciolos largos, casi perpendiculares a limbo.

Seno peciolar

Flor

(Época de floración y caracteres de la flor).

Epoca de vendimia

Racimos Alados grandes para su región, como dos racimos son, unidos.

Fruto

Granos Uva negra redonda, tardía, tipo Monastrell, adaptado y modificado al medio de aquí, ácida y apretada.

Pepitas

Observaciones generales: Detriscencia carminada, como Monastrell.

(Ver T^o redondo)



Cornua - Tinto Garcon -



*Cascon.
(1200)*