

Zona principal de su cultivo , caracteres generales, sinonimia, etc.-

Sinonimia

Vigor

Brote
(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas) . . .

Capullo

Primeras hojitas

Agostados

Madera, etc.
Sarmientos
(Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas) . . .

Tiernos

Zarcillos

Hojas grandes (forma y dimensión)

Hojas
(Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y coloración que toman en el otoño) . . .

Hojas pequeñas (forma y dimensión)

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)

Seno peciolar

Flor
(Época de floración y caracteres de la flor)

Epoca de vendimia

Racimos

Fruto

Granos

Pepitas

Nada nuevo hay que decir aquí de esta variedad poco extendida, aunque típica, y ver la descripción hecha en las Provincias de Orense, Zamora y Leon, ya que en esta última está muy cultivada, sobre todo en los términos del Páramo y La Bañeza, dando vinos finos y alcohólicos.

Requiere una poda generosa.

Sus racimos, sin pisar, se adicionan alguna vez a los mocos de Mencia como madre para los famosos vinos de @guja.

El Prieto Picudo Negro, ya dijimos es igual a casta de Verdejo Negro.

Brota temprano y se hiela alguna vez.

Observaciones generales.



Lugo - Pirelo pseudo-



Leon - Pirelo pseudo-

Zona principal de su cultivo, caracteres generales, sinonimia, etc.- Cepa de gran producción y resistencia al Mildew. Es como un Prieto Picudo. Uva negra. Conjunto foliar de agudos y grandes dientes (típico) de textura ~~fi-~~ ~~Sinensis~~ na (más que las otras clases, lo que es también típico), de envés blanquinoso. El dentado tan agudo y grande de las hojas recuerda algunas variedades de Baleares (verlo allí)

Vigor Bueno; porte rastrero.

<p>Brote (Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas) . . .</p>	<p>Capullo Blanco rosa vivo.</p>
<p>Sarmientos Madera, etc. (Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas)</p>	<p>Primeras hojitas</p> <p>Agostados Madera rojiza (plomo), carminada, acodada, dura, de largas varas. Suave estriado. Entrenudos largos, rectos, medios, nudos aplanados poco salientes; de mucha medula barquillo. Yemas de cabeza blanca borrosas, gordas, aplastadas</p> <p>Tiernos</p>
<p>Hojas (Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y coloración que toman en el otoño)</p>	<p>Zarcillos Bifurcados o trifurcados, largos y delgados.</p> <p>Hojas grandes (forma y dimensión) { Hojas bien quinquilobadas, de dentado gran (de y agudo como Solonis; envés blanquecino { Bien característico lo del dentado y tamaño</p> <p>Hojas pequeñas (forma y dimensión) { Hojas dicho <i>(grandes)</i></p>
<p>Flor (Época de floración y caracteres de la flor)</p>	<p>Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo) Largos, casi perpendiculares al limbo.</p> <p>Seno peciolar Muy abierto, en enorme arco, característico ésto con el dentado descrito.</p>
<p>Fruto</p>	<p>Época de vendimia Media.</p> <p>Racimos Grandes, cortos, ahorquillados casi todos (carácter). Pedúnculo leñoso bien destacado.</p> <p>Granos Negros, apretados, algo elipsoides, (no muy apretados), con pruiné, medios de tamaño, crujientes; pedicelos poco verrugosos, anillo señalado.</p> <p>Pepitas</p>

Observaciones generales.

Defoliación de salpicados vinosos.
Raíces fibrosas y pivotantes, gordas y abundantes lisas.



Nedano
(1195)