

Zona principal de su cultivo, caracteres generales, sinonimia, etc.- Planta de regular vigor que da a los vinos cantidad (buena producción) y azúcar; cepa típica cultivada en la zona de La Bañeza (León) y pueblos próximos. Con Prieto Picudo da los vinos típicos llamados de Aguja. Por su follaje y características es una Garnachilla temprana o la "Garnacha del Norte". así puede llamarse y se llama, todo lo cual ya dice bastante en cuanto a caracteres y descripción por lo que aquí no insistimos. Hay quien dice es el Medoc o el Portugués Bleu (comprobarlo). Mencia es nombre de un pueblo. El (a) Vigor Medio, o poco porte (menos que Garnacha) y temprana.

## Brote

(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojas).

Capullo Típico de color verdoso limpio y lustroso con apenas! pelo arañoso. Es el tipo de cepa de capullo lamiño y puro (más que Garnacha aún, a la que es casi igual). En Garnacha la corola es con Primeras hojas cabeza punta de higo rojiza, que la distingue también. Broto tarde.

## Rama limpia.

Agostados Sarmientos largos, borrosos, pardo-blancuzcos; medula color barquillo, mucha, madera plomiza rojiza al agostar marcado. Entrenudos cortos rectos, yemas bien marcadas, abultadas y gordas. Sarmientos tiernos muy lisos y lamiños de igual abultado nudos, yemas tomando luego ya tinte carmín. Muy típico lo aplastado del sarmiento contra las yemas.

Sarmientos  
Madera, etc.  
(Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas).

Zarcillos Filiformes típicos, delgados y cortos, fuertes, lisos. Insistimos recuerda mucho esta cepa en todo a la Garnacha como decimos.

## Hojas

(Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y duración de su dominio).

Hojas (grandes) forma y dimension. Las grandes de tipo medio, dan la forma de Garnacha aredondeado o de trilobado (quinque-tri) solo rasgado y rebizado, lamiño, liso arriba y abajo, dos filas dientes agudos, aserrados, borde limbo ondulado.

Hojas (pequeñas) forma y dimension. Las hojas pequeñas de la forma de las grandes, algo revoltijadas, de lóbulos triangulares apretados y senos solo rasgados.

Algunas hojas, semejantes al Moscatel hacen como estrellas.

Peciolos forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y rama. De color carmín intenso (lo que no es así en Garnacha), una de las pocas diferencias), lisos, obtusos a limbo.

Seno peciolar En V. bien abierta o lira.

Flor  
(Epoque de floración y características de la flor).

Florece tarde, mas bien tipo medio. Como la Garnacha, o mejor a Tempranillo. En fin de agosto ya tiene claramente negras las uvas, aunque ácidas aún.

## Fruto

Epoche de vendimia // Temprana madurez. Viene de las primeras y la comienzan las avispas en primeros de Septiembre.

Racimos Medianos, tipo enteramente de Garnacha, alados, pedúnculo saliente, corto y leñoso. Racimos de uva apretada. En agosto raspón verde y pedúnculo verde por igual - Luego como pedicelos rojizos.

Granos Muy iguales, tipo igual a Garnacha decimos, elipsoide-redondo.

Dulces, mucilaginosos. Negros con pruiné azulado, sanos. También (como un Portugués bleu. Gota incólora. Los pedicelos se parten muy carminados. Hollejo grueso. Anillo señalado blancuzco (co-verruguoso). Semillas pardo castaño con resto prelongado,

(2 a 3. verde claro, truncado con punta negra en ápice. Quedan (granillos chiquitines verdes con los maduros. El

(fruto de Gateta, igual de temprano, supera mucho a éste. Muy típico los muchos racimos ahorquillados que da. - Buena para comer. - Piel muy colorada. Madura bien.

## Observaciones generales.

Defoliación amarillenta con algunas salpicaduras vinosas y peciolos rojo cereza. Le ataca la erinosis y esto la diferencia igual de la Garnacha.

Muchas raíces fibrosas, carnosas y pivotantes. Descorteza a tiras. Aspecto largo y alto.

Mencia es un pueblo (Ver P.M. 1912 Len. 8. La Mancha y Portedelgadu)

Mildur.

Zona principal de su cultivo, caracteres generales, sinonimia, etc.-

(a).- conjunto foliar es verde a Garnacha, de esa hoja liso todo, en den-  
tado, forma pliegues, rebizado, etc.; igual madera lisa y verde.  
En otoño es salpicado a tabaco y ladrillo viejo.

**Sinonimia**

Vigor

Capullo

Brote  
(Aspecto, co-  
lor del capullo  
y de las prime-  
ras hojitas).

Primeras hojitas

Agostados

Madera, etc.  
(Longitud, for-  
ma, color y ca-  
racteres de los  
entrenudos y  
yemas). . .

Tiernos

Zarcillos

Hojas (grandes) (forma y dimensión)

Hojas

Aspecto ge-  
neral del con-  
junto del folia-  
je, época de ca-  
ída de las hojas  
y coloración  
que toman en  
el otoño, . . .

Hojas (pequeñas) (forma y dimensión)

Peciolos (forma, longitud, coloración y  
modo de unirse al limbo y ramo)

Seno peciolar

Flor

-(Epoa de flo-  
ración y carac-  
teres de la flor)

Epoa de vendimia

Racimos

Fruto

Granos

Pepitas

**Observaciones generales.**

