

Zona principal de su cultivo , caractesres generales, sinonimia, etc.-

Sinonimia

Vigor

Brote
(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas) . .

Capullo

Primeras hojitas

Agostados

Sarmientos
Madera, etc.
(Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas). . . .

Tiernos

Zarcillos

Hojas grandes (forma y dimensión)

Hojas
- (Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y coloración que toman en el otoño). . . .

Hojas pequeñas (forma y dimensión)

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)

Seno peciolar

Flor
- (Epoca de floración y caracteres de la flor)

Epoca de vendimia

Racimos

Fruto

Granos

Pepitas

Ya hemos dicho en Provincia de Orense que es la Valdeorrana, así llamada en Valdeorras, y Moza Fresca Valenciana (no la Valenciana), y en Verín Dña. Blanca o Valencia Blanca = Albán Real.

Cepa blanca de bastante producción no muy vigorosa, y es de las más antiguas, oriunda del Norte de Portugal y Duero.

Da mostos de color pálido (sucio verdoso). Es muy blanda uva, sensible a la humedad, por lo que requiere climas más secos. Cuando comienza a madurar, en fin Septiembre, la uva, su follaje toma un color muy característico como tirando al blanco.

No es cepa que se siga plantando mucho aquí.

Ver descripción detallada en Orense o Leon, decimos.

Nota.- Ver su analogía con Godello y Treixadura, pues algunos las llaman así quizás equivocadamente, en cada lugar.

Observaciones generales.



-Hoja-ver. Oveuse.

Zona principal de su cultivo, caracteres generales, sinonimia, etc.- Cepa de uva blanca llamada mal Moza Fresca Valenciana (A la Valenciana en el término de Verín se la llama Dña. Blanca, y en Valdeorras MOZA FRESCA) por ser algo del tipo Valencí blanco Mesa, aunque redonda y gruesa uva. Cepa originaria, se cree, del Norte de Portugal. Es un tipo a Macabeo o Viura aclimatada a Galicia (quizás derivada de ello) con las variaciones del medio, o a tipo Jaen Blanca, Cayetana. Da un capullo blanco rosa (en esto difiere del Macabeo, pues es blancuzco el otro) y en el extremo (a) Vigor Bueno. Porte erguido (o casi erguido). Madera dura.

Brote (Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas). Capullo Ya hemos señalado como es blancuzco-rosa en extremo, y la particularidad de extremo ramos y primeras hojitas en éstos. (rosas)
Primeras hojitas Blancas, ya marcan senos, cara inferior de peloso abundante lanoso, nervaduras verdosas; y cara superior, algo rugosilla, verde claro, amarillento tormentosa y nervaduras. Capullos yemas Agostados cónicos. *alguna coloración de rosa.*

Sarmientos (Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas). Madera amarillento-carmin, de ramos largos, fuertes, cilíndricos, algo deformados, sarmientos leñosos, estriados, rojos mas vivo, luciente, dura, limpia, algo acodados extremos. Entrenudos cortos **Tiernos** en base, medios luego, redondeados; medula espesa, algo aplastados contra yema, nudos aparentes algo aplanados redondeados, yemas apuntadas, a marrón.- Brota tarde.

Zarcillos Delgados, no muy numerosos, desarrollados.

Hojas (Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y otros rasgos que toman en el otoño). Hojas desiguales, grandes de 5 lóbulos orbiculares, forma redondeada, o más largas que anchas, muy poco pelosas cara superior, lanosas blanco en inferior. Senos laterales estrechos, orbiculares: Hojas grandes (forma y dimensión) limbo espesor medio, amarillento verde, nervaduras más marcadas cara inferior.- Dentado desigual, grandes alternando con pequeños. El color de las hojas normales más pajizo.

Hojas (pequeñas) (forma y dimensión)

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo) Largos, fuertes, asurcados, amarillento-verdosos, luego no, o carminan muy poco (cereza); casi atablillados con alguna manchita de Picadillo de Burgos; casi limpios pelo duvetoso
Seno peciolar (En Merseguera en franco carmin).
En V. que algunas veces se cierra.

Flor (Epoca de floración y caracteres de la flor)

Epoca de vendimia Madura en Septiembre. (fin)

Racimos Grandes, del 3º ojo en adelante, (mayores que Macabeo), colgantes, gruesos, alargados, piramidales con pequeñas alas, algo ramificados, Pedúnculo largo amarillento, leñosos. Raspón verdoso.
Granos Gruesos, redondos, amarillo-verdosos con pruina que da reflejos y maté, firmes, piel fina, ambarinos a madurez (recuerdan al Jaen), carne blanda por lo que se pudren, lo que hace requerir
Pepitas (ría climas y exposición seco para evitarlo. Carne de 2 a 3 roji- jugosa. Jugo algo acidulado, incoloro como pulpa.
zas, grandes. (Pedicelo largo verrugoso, pincel poco abundante,

Observaciones generales.

(adherente mucho, corto amarillo-verdoso; anillo no destacado; estigma señalado con punta negro tí-pico. Es un tipo a Valencí (no lo es) en más redondo.- Carga bien. Vinos pálidos. Cultivada en Orense, Brizgo y Taldem. Requiere clima seco pues se pudre mucho

Defoliación tardía, amarillenta con alguna mancha hoja seca.

Es el Alban Real - (V. Lugo)

Zona principal de su cultivo, sinonimia, caracteres, generales, etc.

(a).- de ramos rosa, cuyo color aquí se extiende a cara superior primeras hojitas y alguna vez orlan la inferior, lo que hace esos extremos ramos muy vistosos así. Esa Valenciana que hemos mencionado puede ser más análoga a Malvasía de Alava si se quiere comparar a algo la dicha Valenciana. Es para nosotros la Moza Fresca el Alban Real y su nombre parece debe ser Uva Fresca... para comer... no Moza Fresca. Muy cultivada en los partidos de Valdeorras, Carballino, Alariz y Celanova a más de en las otras provincias. La Dña. Blanca de otros términos que en algunas partes también designan así simplemente a la Malvasía Blanca o Gruesa sería el Rupeiro Graziolo o Graziolo, a

Vigor (Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas).

Brote

(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas).

Capullo

(base de los que se obtienen los Porto blancos, es (del tipo o casta de la descrita y por ello se señalan estas aproximaciones para compararlas bien y esclarecer la sinonimia.

Primeras hojitas

(El Conjunto foliar en cepas francas da al de (Carrega Somera. Redondeado, lóbulos-quinquilobado

Agostados

(y trilobadas marcados estas bien, por ser pequeños (a veces senos primeros; senos estrechos y tocándose muchos bordes, amarillento-claro-verde cara superior; duvetosa blanco acuajaronado la inferior

Sarmientos

(Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas).

Tiernos

(típico, con nervaduras cara inferior marcadas pedregosas; y amarillentas en cara superior, ésta en (totalidad hojas.- Hojas grandes de textura rugosa (gorda, dentado desigual. En extremo ramos hojas

Zarcillos

(algo acoquilladas a los primeros fríos de otoño (y encorvados con algunos pelosillos lanosos. (Esta variedad no debe ser típica de aquí, por (lo mucho que pudre; quiere decirse es más bien (un producto traído de otras provincias.

Hojas grandes (forma y dimensión)

(Ver Lugo)

Hojas

(Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y coloración que toman en el otoño).

Hojas pequeñas (forma y dimensión)

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)

Seno peciolar

Flor

(Epoca de floración y caracteres de la flor)

Epoca de vendimia

Racimos

Fruto

Granos

Pepitas

Observaciones generales.



"VALDEORRAS"



"MOZA FRESCA"