



MINISTERIO DE AGRICULTURA
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
 CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
 MADRID

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

A L A R I J E
 =====

SUMIDAD.- A. globosa, vellosa, borde carminado. B. globosa, arañosa, ver de puntos rojos.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Algo plegadas al haz, haz arañoso, envés afelpado, verde amarillento.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés más, verde, -- punta del diente oscuro.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno con costillas, arañoso, más zona terminal, verde, alguna raya y nudo rojo.

ZARCILLO.- Intermitente, Fórmula: 00000110011011011011011011011.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, con irregularidades, grande, seno peciolar en U muy abierta, pentalobulada, seno lateral superior con bordes superpuestos, seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés arañoso con nervios acerdados, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos algo torcidos, ángulo del vertice del lóbulo terminal obtuso ó recto, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés amarillento, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados convexos, de color verde, con poco brillo, limbo grueso, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, medio, un poco acerdado, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguida.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, compacto, pedúnculo visible, herbáceo, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño regular, color verde a veces algo ambarino, con pruina, coloración regular, forma algo discoide, ombligo persistentes, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media-fina, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel medio, de color verde, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya. 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde.

SARMIENTO.- 194 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza con zonas desprendidas, sección transversal circular bases aplastadas, superficie con estrias, ó poca pruina, nudos algo salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 10,0 cm. de color marrón gris, rayas más oscuras, yemas cónicas ó dardos.

TRONCO.- Potente.

