



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
MADRID

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

BLANCO CASTELLANO

=====

SUMIDAD.- A. media, afelpada, bordes ligeramente carminados. B. media, -
vellosa, verde blanquecino, puntos oscuros.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz muy arañoso, envés vellosa, -
dientes glabros, verde amarillento.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés muy arañoso, -
verde.

SARMENTO HERBACEO.- Sin lenticelas, sección transversal circular, contorno con costillas, arañoso, muy arañoso al final, verde, nudos y zonas rojas.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 00110011011011010010110.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Cuneorbicular y algunas cuneiformes, mediana, seno peciolar en parentesis ó bordes superpuestos, pentalobulada, seno lateral superior en parentesis ó bordes superpuestos, seno lateral inferior en V, haz glabro, envés arañoso con bordes acerados, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal agudo u obtuso ó recto, superficie algo estampada, nervios de primer orden sobre el envés verde amarillento, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados convexos, de color verde oscuro, poco brillo, limbo medio, nervios de 4º orden, no salientes. Ver fotografía.

PECIOLLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, grueso, un poco arañoso, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguido.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, medio, pedúnculo visible, - semiagostado, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Gruesa, tamaño irregular, color amarillo, - ambar, poca pruina, coloración irregular, forma ovoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa crujiente, sabor neutro, pedicelos largos, de color amarillo, rodete evidente, de color verde claro, pincel medio, de color amarillo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya. 1-2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Amarillo verdoso.

SARMENTO.- 141 cm. de largo, fuerte, bastante ramificado, corteza poco desprendida, sección transversal circular, base aplastada, superficie con estriaciones, poca pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 6,0 cm. de color marrón amarillento, en la base más oscuros, yemas cónicas muy anchas en la base.

TRONCO.- Potente.

BLANCO CASTELLANO

B V



SEP • 70



18-25

