

Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas	Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	M A S S E C A M P
1.- SUMIDAD	A. media, vellosa, blanco verdoso con bordes carminados. B. globosa, vellosa, blanco verdoso con bordes carminados.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, haz arafioso, envés vellosa, verde amarillento.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	En general, extendidas, haz algo arafioso, envés vellosa, verde claro.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sección transversal circular, contorno con costillas, enteramente glabro, parcialmente verde con rayas rojas.
5.- ZARCILLO	Subcontinuo. Formula: 00110011011011011011001100
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Pentagonal, mediana algo grande, seno peciolar en parentesis, pentalobulada, seno lateral superior en lira o parentesis o con bordes superpiestos, seno lateral inferior en V, haz glabro, envés arafioso, con 5 nervios, limbo algo torcido, lobulos torcidos, angulo del vertice del lobulo terminal casi recto, superficie con pocas ampollas, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados convexos, algunos arqueados, de color verde oscuro con poco brillo, limbo medio, nervios de orden 4º. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Corto, un poco arafioso, grueso, sección poco evidente.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Algo postrada.
10.- RACIMO CON MADURACION INDUSTRIAL	Medio, suelto, pedunculo visible, herbaceo, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADURACION INDUSTRIAL	Media, tamaño irregular, color ambarina, con pruina coloración irregular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa jugosa, sabor neutro pedicelo medio de color verde, rodete evidente de color verde, pincel corto de color amarillo, separación difícil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía
13.- FOLLAJE EN OTONO	Amarillas, algunas verdes con puntos amarillos.
14.- SARMIENTO	145 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, sección casi circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos aplastados, enteramente glabro, entrenudos de longitud media 5,5 cm. de color marrón amarillento con rayas marrones, yemas en dardo.
15.- TRONCO	Potente.

no salientes


11-12

Instituto Nacional
de
Investigaciones
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

MASACAMPS MASSECCAMP



• MAY • 71

