

Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas	Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	P A L O M I N O F I N O
1.- SUMIDAD	A. globosa, vellosa-algodonosa, blanca. B. globo sa, vellosa, verde blanquecina.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, haz arafioso, envés algodonoso, verde amarillento.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidas, haz glabro, envés vellosa, verde.
4.- SARMIENTO HER BACEO	Sección transversal regular, contorno con costi- llas, totalmente glabro, totalmente rojo.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Formula: 00011010001011011011011011 011011011011011011011011001001101
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Pentagonal, mediana, seno peciolar en parentesis, pentalobulada, seno lateral superior en parente- sis, seno lateral inferior en V, haz glabro, en- vés arafioso, limbo plegado hacia el haz, lobulos planos, angulo del vertice del lobulo terminal - agudo, superficie lisa, nervios de primer orden - sobre el envés verde amarillento, nervios de pri- mer orden sobre el haz parcialmente rojos, dien- tes de lados convexos de color verde fuerte sin - brillo, limbo medio-grueso, nervios de orden 4º - no salientes. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Corto, medio, arafioso, sección poco evidente.
9.- PORTE DE LA - VEGETACION	Rastrero.
10.- RACIMOS CON - MADURACION IN DUSTRIAL	Media, medio, pedunculo visible, agostado, longi- tud relativa 1/6. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADU- REZ INDUSTRIAL	Media, tamaño irregular, color dorado, con pruina coloración irregular, forma discoide, ombligo per- sistente, sección transversal regular, zumo inco- loro, piel gruesa, pulpa jugosa, sabor neutro, pe- dicelo largo de color verde, rodete evidente de - color verde, pincel corto de color amarillo, sepa- ración difícil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 3. Ver fotogra- fía,
13.- FOLLAJE EN OTO ÑO	Verde con manchas marrones, envés verdes.
14.- SARMIENTO	144 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superfi- cie con estrias, parcialmente con pruina, nudos - salientes, totalmente glabro, entrenudos de longi- tud media 6,4 cm. de color marrón a rayas, yemas cónicas.
15.- TRONCO	Potente.

12-1

Instituto Nacional
de
Investigaciones
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

PALOMINO *Huelva*



• SEP • 71

