MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

P A N S E S

SUMIDAD.- A. media, arañosa, verde blanquecino, bordes bronceados manchas carminadas. B. media, vellosa, verde amarillento, puntos carminados.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés velloso, dientes glabros, amarillo.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz muy poco arañoso, envés algo, verde amarillento.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno con costillas, casi glabro, final algo arañoso, verde con alguna mancha rojiza, nudos rojizos.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 00101001101100110011011011001l0.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Cuneorbicular, pequeña, seno peciolar en parentesis un poco abierto, pentalobulada, seno lateral superior en V ó lira, seno lateral inferior en V ó lira, haz, glabro, envés arañoso con nervios acerdados, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos torcidos, ángulo del vértice del lóbulo terminal agudo, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés amarillo, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados convexos, de color verde, poco brillo, limbo medio, nervios de 4º orden, no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, fino, muy poco arañoso, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguida.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, suelto, pedúnculo visible, herbaceo, longitud relativa 1/5. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Gruesa, tamaño regular, color, amarillo, con pruina, coloración regular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa blanda, sabor neutro, pedicelo largo, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel medio, de color amarillo, separación dificil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de serillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde amarillento.

SARMIENTO.- 139 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente, nudos aplastados, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 5,4 cm. de color amarillo-rojizo, totalmente, yemas redondeadas.

TRONCO.- Potente.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06 DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA P A N S E S	
1.- SUMIDAD	A. media, arañosa, verde blanquecino, bordes bronceados, manchas carminadas. B. media, vellosa, verde amarillento, puntos carminados.	
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, haz arañoso, envés velloso, dientes glabros, amarillo.	
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidas, haz muy poco arañoso, envés algo, verde amarillento.	
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sección transversal circular, contorno con costillas casi glabro, final algo arañoso, verde con alguna mancha rojiza, nudos rojizos.	
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula: 00101001101100110110110011O.	
6.- FLOR	Ver fotografía.	
7.- HOJA ADULTA	~~Cuneorbicular~~ Pentagonal, pequeña, seno peciolar en parentesis un poco abierto, pentalobulada, seno lateral superior en V ó lira, seno lateral inferior en V ó lira haz glabro, envés arañoso con nervios acerdados, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos torcidos, ángulo del vértice del lóbulo terminal agudo superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés amarillo, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados convexos, de color verde, poco brillo, limbo medio, nervios de 4º orden, no salientes. Ver fotografía.	
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Corto, fino, muy poco arañoso, sección poco evidente.	
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Erguida.	
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Grande, suelto, pedúnculo visible, herbáceo, longitud relativa 1/5. Ver fotografía.	
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Gruesa, tamaño regular, color amarillo, con pruina, coloración regular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa blanda, sabor neutro, pedicelo largo, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel medio, de color amarillo, separación dificil. Ver fotografía.	
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.	
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Verde amarillento.	
14.- SARMIENTO	139 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente, nudos aplastados, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 5,4 cm. de color amarillo-rojizo, totalmente, yemas redondeadas.	
15.- TRONCO	Potente.	

11-75

INSTITUTO NACIONAL
DE
INVESTIGACIONES
AGRONOMICAS

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

PANSES (Castellón)

• OCT • 71