



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

T O R R O N T E S (C O R D O B A)
=====

SUMIDAD.- A. globosa, lanosa-arañosa, bronceada, con algo rojo. B. globosa, arañosa, regiones bronceadas.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Desplegada, lisa, leonada en rojo.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, glabras, verdes.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno liso, enteramente glabro, enteramente verde.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 000110110110110110110110110110100

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, mediana, seno peciolar en lira, pentalobulada, seno lateral superior superpuesto, seno lateral inferior superpuesto, - haz glabro, envés glabro, con 5 nervios, limbo plegado, lobulo torcido, engulo del vertice del lobulo terminal agudo, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados arqueados, de color verde sin brillo, limbo poco grueso, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE HOJA ADULTA.- Largo, grueso, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACIÓN.- Erguida.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, medio, con pedunculo visible, herbaceo, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADURACIÓN INDUSTRIAL.- Gruesa, tamaño irregular, color ambarino, con poca pruina, coloración irregular, forma fusiforme, ombligo no persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa - pulpa carnosa, sabor neutro aspero, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel muy corot, de color amarillo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya, 1. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Pardo tostado en haz, y algo en envés, casi todo el peciolo rojizo oscuro.

SARMIENTO.- 200 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie con estrias poco marcadas, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 108 mm., de color marrón-rojizo con rayas violáceas, yemas conicas.



TRONCO.- Potente.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06	
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA	
	T O R R O N T E S (C O R D O B A)	
1.- SUMIDAD	A. globosa, lanosa-arañosa, bronceada, con algo - rojo. B. globosa, arañosa, regiones bronceadas.	
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Desplegada, lisa, leonada en rojo.	
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidas, glabras, verdes.	
4.- SARMIENTO HER BACEO	Sección transversal circular, contorno liso, ente ramente glabro, enteramente verde.	
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula: 000110110110110110110110110 110110100.	
6.- FLOR	Ver fotografía.	
7.- HOJA ADULTA	Orbicular, mediana, seno peciolar en lira, penta- lobulada, seno lateral superior/superpuesto, seno lateral inferior/superpuesto, haz glabro, envés - glabro, con 5 nervios, limbo plegado, lóbulo tor- cido, angulo del vertice del lóbulo terminal agu- do, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados arqueados, de color verde sin brillo, limbo poco grueso, nervios de - orden 4º no salientes. Ver fotografía.	
8.- PECIOLO DE - HOJA ADULTA	Largo, grueso, glabro, sección poco evidente.	
9.- PORTE DE LA - VEGETACION	Erguida.	
10.- RACIMOS CON - MADURACION IN DUSTRIAL	Grande, medio, con pedúnculo visible, herbáceo, - longitud relativa 1/4. Ver fotografía.	
11.- BAYA CON MADU RACION INDUS- TRIAL	Gruesa, tamaño irregular, color ambarino, con po- ca pruina, coloración irregular, forma fusiforme, ombligo no persistente, sección transversal regu- lar, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa carnosa, - sabor neutro aspero, pedicelo medio, de color ver- de, rodete evidente, de color verde, pincel muy - corto, de color amarillo, separación difícil, Ver fotografía.	
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya, 1. Ver fotogra- fía.	
13.- FOLLAJE EN - OTOÑO	Pardo tostado en haz, y algo en envés, casi todo - el peciolo rojizo oscuro.	
14.- SARMIENTO	200 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superfi- cie con estrias poco marcada, parcialmente con - pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entre- nudos de longitud media 108 cm., de color marrón- rojizo con rayas violáceas, yemas cónicas.	

/bordes
superpuestos

TORRONTES (Córdoba)

BM



25 W B 12