

2 Mal?

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06	
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA	
	V E R E M A B L A N C A	
1.- SUMIDAD	A. casi abierta, vellosa, verde, algo blanquecina, bordes algo bronceados. B. globosa, vellosa, verde blanquecino.	
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, haz vellosa, envés algodonoso, dientes glabros, blanco amarillento.	
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidas, haz arañoso, envés vellosa, verde amarillento, con ligera sombra rojiza.	
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sección transversal circular, arañoso y final casi vellosa, marrón con rayas verdes, final verde.	
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula: 1100110110110.	
6.- FLOR	Ver fotografía.	
7.- HOJA ADULTA	Orbicular, grande, seno peciolar en parentesis, - pentalobulda ó trilobulada, casi enteras, seno lateral superior en lira ó V, seno lateral inferior en V, haz glabro, envés vellosa, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos torcidos, ángulo del vértice del lóbulo terminal obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verdes, punto peciolar rojo, nervios de primer orden sobre el haz verde, punto peciolar rojo, dientes de lados rectilíneos, de color verde, poco brillo, limbo grueso, nervios de 4º orden, no salientes. Ver fotografía.	
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Medio, grueso, poco arañoso, sección poco evidente.	
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Erguido.	
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Medio, semicompacto, pedúnculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.	
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Gruesa, tamaño regular, color azul-mora, mucha pruina, coloración regular, forma esferoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa blanda, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel corto, de color rojizo, separación difícil. Ver fotografía.	
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 2. Ver fotograf.	
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Amarillo verdoso con manchas pardas.	
14.- SARMIENTO	153 cm. de largo, fuerte, algo ramificado, corteza se desprende algo, sección transversal circular, - superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos aplastados, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 6,00 cm. de color marrón rojizo, uniforme, yemas cónicas.	
15.- TRONCO	Potente.	

11-65

INSTITUTO NACIONAL
DE
INVESTIGACIONES
AGRONOMICAS



CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES
AGRONOMICAS 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

VEREMA BLANCA (Valencia)



OCT • 71



Las fotos de las hojas no se corresponden con la descripción (Félix Cabello y Sonia García, Diciembre 2010).