



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPLEOLOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

ALCAÑON BLANCO

=====

SUMIDAD.— A. media, arañosa, verde blanquecino, manchas carminadas y bordes bronceados. B. media, vellosa, verde blanquecino, puntos rojos y marrones.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.— Extendidas, haz arañoso, envés velloso, amarillo, verdoso, dientes marrones.

HOJAS JOVENES INFERIORES.— Extendidas, haz arañoso, envés casi velloso, verde amarillento.

SARMIENTO HERBACEO.— Sin lenticelas, sección transversal circular, con tornillo con costillas, algo arañoso, final más, verde con nudos y rayas rojas, enteramente.

ZARCILLO.— Intermitente. Fórmula: 0001011011011011011011.

FLOR.— Ver fotografía.

HOJA ADULTA.— Orbicular, mediana, seno peciolar en parentesis, trilobulada y penta, seno lateral superior en U cerrada, seno lateral inferior cuando los hay en U, haz glabro, envés arañoso, haz y envés de 5 nervios arañosos, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal recto, superficie ligeramente estampada, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados rectos, de color verde fuerte, con brillo, limbo grueso, nervios de 4º orden. Ver fotografía.

PECIOLLO DE LA HOJA ADULTA.— Medio, grueso, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.— Erguido.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.— Grande, medio, pedúnculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/5-1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.— Gruesa, tamaño irregular, color verde blanquecino, con pruina, coloración regular, forma algo elipsoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa blanda-jugosa, sabor neutro, pedicelo largo, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel medio, de color verde amarillento, separación difícil. Ver fotografía.

SEILLA.— Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.— Verde claro.

SARMIENTO.— 150 cm. de largo, fuerte, poco ramificado, corteza se desprende a tiras, sección transversal circular, superficie estriada, sin pruina, nudos salientes, poco, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 9,1 cm. de color amarillo, manchas gris, con manchas, yemas redondeadas.

TRONCO.— Medio.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06	
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA	
	ALCAÑON BLANCO	
1.- SUMIDAD	A. media, arañosa, verde blanquecino, manchas carmadas y bordes bronceado. B. media, velloso, verde blanquecino, puntos rojos y marrones.	
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, haz arañoso, envés velloso, amarillo, - verdoso, dientes marrones.	
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidas, haz arañoso, envés casi velloso, verde amarillento.	
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sin lenticelas, sección transversal circular, contorno con costillas, algo arañoso, final más, verde con nudos y rayas rojas, enteramente.	
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula: 0001011011011011011011.	
6.- FLOR	Ver fotografía.	
7.- HOJA ADULTA	PENTAGONAL Orbiculada, mediana, seno peciolar en parentesis, -- trilobulada, y penta, seno lateral superior en U cerrada, seno lateral inferior cuando los hay en ^{en parentesis} U, - haz glabro, envés arañoso, haz y envés de 5 nervios arañosos, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal recto, superficie ligeramente estampada, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados rectos, de color verde fuerte, con brillo, limbo grueso, nervios de 4º orden. Ver fotografía.	
8.- PECIOLLO DE LA HOJA ADULTA	Medio, grueso, glabro, sección poco evidente.	
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Erguido.	
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Grande, medio, pedúnculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/5 - 1/4. Ver fotografía.	
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Gruesa, tamaño irregular, color verde blanquecino, con pruina, coloración regular, forma algo elíptica , ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa blanda-jugosa sabor neutro, pedicelo largo, de color verde, rodeado evidente, de color verde, pincel medio, de color amarillento, separación difícil. Ver fotografía.	
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya \bar{x} . Ver fotografía.	
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Verde claro.	
14.- SARMIENTO	150 cm. de largo, fuerte, poco ramificado, corteza se desprende a tiras, sección transversal circular, superficie estriada, sin pruina, nudos salientes, ^{po} co totalmente glabro, entrenudos de longitud media 9,1 cm. de color amarillo, manchas gris, con manchas yemas redondeadas.	
15.- TRONCO	Medio.	


Instituto Nacional
de
Investigaciones
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

ALCAÑON BLANCO (HU)

B V



FEB • 72

