



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

B E B A
=====

SUMIDAD..- A. media, algodonosa, blanco. B. abierta, vellosa, verde - claro, algún punto carmín.

HOJAS JOVENES SUPERIORES..- Extendida, algo plegada al haz, haz y envés velloso, envés borde glabro, verde blanquecino.

HOJAS JOVENES INFERIORES..- Extendidas, haz y envés arañoso, verde claro algo rojizo.

SARMIENTO HERBACEO..- Sección transversal irregular, contorno con costillas, zona terminal vellosa resto arañoso, verde con rayas rojas.

ZARCILLO..- Intermitente. Fórmula: 00110110110110110110110.

FLOR..- Ver fotografía.

HOJA ADULTA..- Orbicular, mediana, seno peciolar, con bordes superpuestos, pentalobulada, seno lateral superior en lira o con bordes superpuestos, seno lateral inferior en lira, haz muy poco arañoso, envés - arañoso, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos algo torcidos ángulo del vértice del lóbulo terminal obtuso, superficie algo estampada, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados convexos, de color verde oscuro, poco brillo, limbo grueso, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOL DE LA HOJA ADULTA..- Corto, grueso, algo arañoso, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION..- Postrada casi rastrera.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL..- Medio, suelto, pedúnculo evidente, semiagostado, longitud relativa 1/5. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL..- Grande, tamaño irregular, color ambarino, algo de pruina, coloración irregular, forma elipsoide, ombligo -- persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa carnosa, sabor neutro, pedicelo largo, de color verde, rodete - evidente, de color verde, pincel largo, de color amarillo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA..- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO..- Verde.

SARMIENTO..- 252 cm. de largo, fuerte, poco ramificado, corteza desprendida a tiras, sección transversal circular-irregular, superficie estriada, poca pruina, nudos algo salientes, totalmente glabro, entrenudos - de longitud media 10,8 cm. de color marrón grisaceo, irregular, yemas cónicas.

TRONCO..- Potente.

Instituto Nacional
de
Investigaciones
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

B E B A C A



FEB • 72 •

