



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

D O N B U E N O  
=====

SUMIDAD.- Media, lanosa-arañosa, verde pálido. B. media, arañosa, verde pálido.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Desplegada, liso el haz, aterciopelada el envés, verde.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Algo plegada, glabra, verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal elíptica, contorno liso, enteramente glabro, parcialmente alguna raya roja.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 01011001101100101101101101000

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal, mediana, seno peciolar en lira, pentalobulada, seno lateral superior en parentesis, seno lateral inferior en v, haz glabro, envés glabro, con 5 nervios, limbo plano, lobulos planos, angulo del vertice del lobulo terminal obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés parcialmente rojos, nervios de primer orden sobre el haz parcialmente rojos, dientes de lados convexos, de color verde fuerte con algo de brillo, limbo poco grueso, nervios de orden 5º no salientes.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguido.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, medio, pedunculo visible, herbaceo, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.


BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño regular, color amarillo, con poca pruina, coloración irregular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel fina, pulpa carnosa, sabor neutro, pedicelo lardo de color verde, rodete evidente de color verde, pincel medio de color amarillo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 3. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Amarillo, con pintas marrón oscuro, pedicelo con regiones pardo rojizas.

SARMIENTO.- 120 cm. de largo, fuerte, poco ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie con estrias, pocas marcas, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 75 mm., de color amarillento con rayas marrones, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.



25 III A 20

