



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

F O R C A L L A T
=====

SUMIDAD.-- A. media, algo arañosa, verde. B. media, algo arañosa, verde -
claro.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.-- Extendidas, haz y envés glabros, verde algo -
bronceado.

HOJAS JOVENES INFERIORES.-- Extendidas, haz y envés glabros, verde.

SARMIENTO HERBACEO.-- Sección transversal circular, glabro, verde con algu-
na zona bronceada, muy tenue, nudos más oscuros.

ZARCILLO.-- Intermitente. Fórmula: 000101100110110.

FLOR.-- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.-- Orbicular, media, seno peciolar en parentesis, pentalobula-
da, seno lateral superior en lira ó V, seno lateral inferior en V, haz -
glabro, envés más glabro, haz y envés de 5 nervios, limbo plegado al haz,
lóbulos torcidos, ángulo del vértice del lóbulos terminal obtuso, super-
ficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés amarillo, nervios de -
primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados rectilíneos o ar-
queados de color verde, poco brillo, limbo medio, nervios de 4º orden, no
salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.-- Corto, grueso, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.-- Erguido.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.-- Medio, suelto, pedúnculo visible, se-
miagostado, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.-- Gruesa, tamaño irregular, color amarillo, mu-
cha pruina, coloración regular, forma esferoide, ombligo persistente, se-
cción transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa crujiente, -
sabor neutro, pedicelo largo, de color verde, rodete evidente, de color -
verde, pincel corto, de color amarillo, separación difícil. Ver fotogra-
fía.

SEMILLA.-- Número medio de semillas por baya 1. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.-- Verde amarillento.

SARMIENTO.-- 146 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza se desprende
a tiras, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente
con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud me-
dia 7,1 cm. de color marrón rojizo algo amarillo, uniforme yemas cónicas.

TRONCO.-- Pontentísimo.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06	
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA	
	F O R C A L L A T	
1.- SUMIDAD	A. media, algo arañosa, verde. B. media, algo arañosa, verde claro.	
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, haz y envés glabros, verde algo bronceado.	
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidas, haz y envés glabros, verde.	
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sección transversal circular, glabro, verde con algunas zona bronceada, muy tenue, nudos más oscuros.	
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula: 000101100110110.	
6.- FLOR	Ver fotografía.	
7.- HOJA ADULTA	Orbicular, media, seno peciolar en parabólica ^V , lobulada ^{trilobulada} , seno lateral superior en lira ó V, seno lateral inferior en V, haz glabro, envés más glabro haz y envés de 5 nervios, limbo plegado, al haz, lóbulos torcidos, ángulo del vértice del lóbulo terminal obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés amarillo, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados rectilíneos o arqueados de color verde, poco brillo, limbo medio, nervios de 4º orden, no salientes. Ver fotografía.	
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Corto, grueso, glabro, sección poco evidente.	
9.- PORTE DE LA - VEGETACION	Erguido.	
10.- RACIMOS CON - MADURACION INDUSTRIAL	Medio, suelto, pedúnculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.	
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Gruesa, tamaño irregular, color amarillo, mucha pruina, coloración regular, forma esferoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa crujiente, sabor neutro, pedicelo largo, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel corto, de color amarillo, separación difícil. Ver fotografía.	
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 1. Ver fotografía.	
13.- FOLLAJE EN - OTOÑO	Verde amarillento.	
14.- SARMIENTO	146 cm. de largo, fuertem muy ramificado, corteza se desprende a tiras, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 7,1 cm. de color marrón rojizo algo amarillo, uniforme, yemas cónicas.	
15.- TRONCO	Potentísimo.	

11-72

Instituto Nacional
de
Investigaciones
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

FORCALLAT

