



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

G U A L A R I D O
=====

SUMIDAD.- A. globosa, afelpada, blanca. B. globosa, afelpada, blanco - con bordes verdes.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz velloso, envés afelpado, ver de blanco con bordes verdes.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés algodonoso, verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno liso, parcialmente arañoso, totalmente verde.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 001011011011011011011011011011

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal, grande, seno peciolar en V, con una o dos - uñas, pentalobulada, seno lateral superior en lira cerrada, seno lateral inferior en U, haz glabro, envés casi velloso, con 5 nervios, limbo plegado hacia el haz, lobulos algo plegados, angulo del vertice del lobulo terminal agudo, superficie con ampollas, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz - verdes, dientes de lados convexos de color verde oscuro sin brillo, - limbo casi grueso, nervios de orden 5º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Rastrero.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, medio, pedunculo visible, - agostado hasta la primera ramificación, longitud relativa 1/7, Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Pequeña, tamaño irregular, color amarillo algo rosaceo, con poca pruina, coloración irregular, forma elipsoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, - piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo corto de color verde, rodete poco evidente de color verde, pincel largo-medio, de color amarillento, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde amarillento, nervios verdes.

SARMIENTO.- 280 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza algo desprendida, sección transversal elíptica, superficie con estrias, sin pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 8,9 - cm. de color rojizo con manchas negras, yemas puntiagudas.

TRONCO.- Potente.



SEP 69

