



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

J U A N I B A Ñ E Z
=====

SUMIDAD.- A. media, arañosa, verde pálido. B. media, arañosa, verde pálido.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés glabro, verde amarillo, con tinte bronceado.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz ligeramente arañoso, envés glabro, verde amarillo con brillo.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal cilíndrica, muy lisa, contorno ligeramente arañoso, al final más, verde con escasas zonas bronceadas, irregulares enteramente.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 1100110110110110.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Casi orbicular, mediana, seno peciolar en parentesis muy abierto, pentalobulada, seno lateral superior en lira (algunos con diente), seno lateral inferior en U. (algunos con diente), haz glabro, envés glabro, haz y envés de 5 nervios, acerdados, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal recto, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés amarillento punto peciolar y manchas rojas, nervios de primer orden sobre el haz rojo extremos verdes, dientes de lados convexos o rectos, de color verde botella, poco brillo, limbo grueso, nervios de 4º orden, **no salientes**. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguido.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, medio, pedúnculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Mediana, tamaño regular, color azul-negro, mucha pruina, coloración regular, forma casi esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa crujiente, sabor neutro, pedicelo largo de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel corto-medio, de color rojo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 1. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde bronceado, con zonas rojas oscuras.

SARMIENTO.- 124 cm. de largo, fuerte, sin ramificar, corteza se desprende algo, sección transversal circular, superficie lisa, sin pruina, nudos un poco salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 7 cm. de color amarillo-rojizo, uniforme, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	JUAN IBÁÑEZ
1.- SUMIDAD	A. media, arañosa, verde pálido. B. media, arañosa, verde pálido.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, haz arañoso, envés glabro, verde amarillo, con tinte bronceado.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidas, haz ligeramente arañoso, envés glabro, verde amarillento con brillo.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sección transversal cilíndrica, muy lisa, contorno ligeramente arañoso, al final más, verde con escasas zonas bronceadas, irregulares enteramente.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula: 1100110110110110.
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Casi orbicular, mediana, seno peciolar en parentesis muy abierto, pentalobulada, seno lateral superior en lira (algunos con diente), seno lateral inferior en U. (algunos con diente), haz glabro, envés glabro, haz y envés de 5 nervios, acerdados, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal recto, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés amarillento punto peciolar y manchas rojas, nervios de primer orden sobre el haz rojo extremos verdes, dientes de lados convexos o rectos, de color verde botella, poco brillo, limbo grueso, nervios de 4º orden, no salientes. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Corto, medio glabro, sección poco evidente.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Erguido.
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Medio, medio, ^{esquadrado} pedúnculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Mediana, tamaño regular, color azul-negro, mucha pruina, coloración regular, forma casi esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa crujiente, sabor neutro, pedicelo largo de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel corto-medio, de color rojo, separación difícil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 1. Ver fotografía.
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Verde bronceado, con zonas rojas oscuras.
14.- SARMIENTO	124 cm. de largo, fuerte, sin ramificar, corteza se desprende algo, sección transversal circular, superficie lisa, sin pruina, nudos un poco salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 7 cm. de color amarillo-rojizo, uniforme, yemas cónicas.
15.- TRONCO	Potente.

14-68

Instituto Nacional
de
Investigaciones
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

JUAN IBAÑEZ



FEB • 72

