



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
MADRID

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

M A N T U O J E R E Z A N O

=====

SUMIDAD.- A. globosa, vellosa, bordes carminados. B. media, vellosa al godonosa, blanca

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz veloso, envés algodonoso, verde amarillo.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz acerdado, envés arañoso, - verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal algo eliptica, contorno con costillas, parcialmente poco acerdado, parcialmente verde con alguna raya roja.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 01011011011011010

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal, grande, seno peciolar con bordes superpuestos, pentalobulada, seno lateral superior con bordes superpuestos, seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés arañoso, limbo torcido, lobulos torcidos, angulo del vertice del lobulo terminal recto, superficie con alguna ampolla, nervios de primer orden sobre el envés verde amarillento, nervios de primer orden sobre el haz verde pálido, dientes de lados convexos, de color verde fuerte sin brillo, limbo grueso, nervios de orden 5º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, grueso, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrado.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, mediano, pedunculo visible, herbaceo, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Gruesa, tamaño irregular, color ambarino con manchas marrones, con pruina, coloración irregular, forma ovoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa carnosa, sabor neutro, pedicelo medio de color verde, rodete evidente de color verde, pincel corto de color amarillo, separación difícil. Ver fotografía.




SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 3. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Haz verde con pocas manchas marrones, envés verde.

SARMIENTO.- 133 cm. de largo, fuerte, ramificado, la corteza se desprende a tiras, sección transversal algo eliptica, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 9,8 cm. de color pardo rojizo con alguna raya, yemas casi en dardo.

MANTUO JEREZANO

B V



19
21