

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06	
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA	
	M E N C I A	
1.- SUMIDAD	A. media, algo arañosa, verde. B. media, arañosa, - verde.	
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, haz y nervios del envés arañosos, envés glabro, verde con brillo.	
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Algo plegadas al haz, haz y nervios del envés ligeramente arañosos, envés glabro, verde con brillo.	
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sección transversal cilíndrica, algo aplastada por un lado, contorno sin costillas, verde enteramente, glabro enteramente.	
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula: 0110011011011011011011010.	
6.- FLOR	Ver fotografía.	
7.- HOJA ADULTA	Cuneiforme, mediana, seno peciolar en U abierta, -- pentalobulada, seno lateral superior en general en V ó lira, poco marcada, a veces más, seno lateral - inferior en V ó lira, menos marcada que antes, haz glabro, envés glabro, haz y envés de 5 nervios, glabros, limbo doblado hacia el haz, lóbulos doblados hacia el haz, ángulo del vértice del lóbulo terminal obtuso, superficie mas bien lisa, nervios de -- primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados con vexos de color verde botella, sin brillo, limbo de medio a fino, nervios de 5º orden no salientes. Ver fotografía.	
8.- PECIOLLO DE LA HOJA ADULTA	Medio, medio glabro, sección no evidente.	
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Medio erguido.	
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Medio, medio, pedúnculo visible, verde, longitud relativa 1/5. Ver fotografía.	
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Media, tamaño regular, color azul violeta, con pruina, coloración regular, forma elipsoidal, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa blanda, sabor insípido, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color rojizo, pincel medio, de color morado, separación difícil, Ver fotografía.	
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya. 2. Ver fotografía	
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Verde con muchas zonas rojo oscuro.	
14.- SARMIENTO	112 cm. de largo, endeble, no ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 4,3 cm. de color marrón claro, a bandas, yemas cónicas.	
15.- TRONCO	Potente.	

14-19

Instituto Nacional
de
Investigaciones
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

MENCIA *Salamece*



• SEP • 71

