



14-17  
Cuenca 1970 Si moscatel

MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPLEOLOGRAFIA Y VITICULTURA  
MADRID

MOSCATEL MENUDOS DE SALAMANCA

SUMIDAD. - A. de media a globosa, vellosa, verde blanquecino con algo carminado. B. abierta, arañosa, verde con puntos rojos.

HOJAS JOVENES SUPERIORES. - Dobladas hacia el haz por el nervio central, - haz y envés arañosos, rojas, las zonas de los nervios verdes.

HOJAS JOVENES INFERIORES. - Ligeramente plegadas hacia el haz, haz glabro, envés con los nervios arañosos, verdes con zonas rojas.

SARMIENTO HERBACEO. - Sección transversal circular, contorno con costillas, glabro, con zona terminal arañoso, enteramente verde con rayas rojas, más abundantes en la zona terminal.

ZARCILLO. - Intermitente. Formula: 011011010110110110110110

FLOR. - Ver fotografía.

HOJA ADULTA. - Pentagonal, achatada, por arriba redondeada, media, seno peciolar en lira, pentalobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en V, haz glabro, envés con nervios arañosos, con 5 nervios, limbo algoplegado hacia el haz, lobulos un poco torcidos, angulo del vértice del lobulo terminal obtuso, superficie algo estampada, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, algunos puntos peciolares rosas, - nervios de primer orden sobre el haz verde claro, algunos puntos peciolares rosas, dientes concavos-convexos de color verde botella con algo de brillo, limbo grueso, nervios de 5º orden. Ver fotografía.

PECIOLLO DE LA HOJA ADULTA. - Corto, grueso, arañoso, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION. - Ligeramente erguida.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL. - Pequeño, medio, pedunculo visible, - herbaceo, longitud relativa 1/5. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL. - Pequeña, tamaño regular, color amarillo dorado, sin pruina, coloración regular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor (álico) neutro, pedicelo medio de color verde claro, rodete evidente de color verde, pincel corto de color amarillo, separación difícil. - Ver fotografía.

SEMILLA. - Número medio de semillas por baya 1. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO. - Amarillo verdoso.

SARMIENTO. - 245 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza resistente, sección transversal aplastada, superficie con estrías, nudos aplastados, totalmente glabros, entrenudos de longitud media 7,2 cm. de color beige con manchas más oscuras, yemas cónicas.

TRONCO. - Medio.

**INSTITUTO NACIONAL  
DE  
INVESTIGACIONES  
AGRONOMICAS**

**CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES  
AGRONOMICAS 06**

**DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA**

**MOSCATEL MENUDO DE SALAMANCA**


1.- SUMIDAD	A. media a globosa, vellosa, verde blanquecino con algo carminado. B. abierta, arañosa, verde con puntos rojos.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Dobladas hacia el haz por el nervio central, haz y envés arañosos, rojas, las zonas de los nervios verdes.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Ligeramente plegadas hacia el haz, haz glabro, envés con los nervios arañosos, verdes con zonas rojas.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sección transversal circular, contorno con costillas, glabro, con zona terminal arañoso, enteramente verde con rayas rojas, más abundantes en la zona terminal.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula: 011011010110110110110110.
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Pentagonal, achata da, por arriba redondeada, media, seno peciolar en lira, pentalobulda, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en V, haz glabro, envés con nervios arañosos, con 5 nervios, limbo algo plegado hacia el haz, lóbulos un poco, torcidos, angulo del vértice del lóbulo terminal obtuso, superficie algo estampada, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, algunos puntos peciolares rosas, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, algunos puntos peciolares rosas, dientes concavos-convexos de color verde botella con algo de brillo, limbo grueso, nervios de 5º orden. Ver fotografía.
8.- PECIOL DE LA HOJA ADULTA	Corto, grueso, arañoso, sección poco evidente.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Ligeramente erguida.
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Pequeño, medio, pedúnculo visible, herbaceo, longitud relativa 1/5. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Pequeña, tamaño regular, color amarillo, dorado, sin pruina, coloración regular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro pedicelos medios de color verde claro, rodete evidente de color verde, pincel corto de color amarillo, separación difícil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 1. Ver fotografía.
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Amarillo verdoso.
14.- SARMIENTO	245 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza resistente, sección transversal aplastada, superficie -

	con estriás, nudos aplastados, totalmente glabros, entrenudos de longitud media 7,2 cm. de color beige con mandas más oscuras, yemas cónicas.	
15.- TRONCO	Medio.	
		AGRONOMÍA
		CACIMUS - I
		SUPERIOR
		SUPERIOR
		A. SACARÍMOS HHR
		BACAO
		C. ARCAÍO
		D. FLO
		E. ATUCA ALTA - I
		F. ATUCA ALTA - II
		G. PORTA DE LA MONTAÑA
		H. MANDARACIONES
		I. RACIMOS GCH - I
		J. MANDARACIONES
		K. BAYA CON MAM
		L. BAYA CON MAM
		M. BAYAS - II
		N. TALLER EN OLOT
		O. TALLER EN OLOT

INSTITUTO NACIONAL  
DE  
INVESTIGACIONES  
AGRONOMICAS

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES  
AGRONOMICAS 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA  
MOSCATEL MENUDO (Salamanca)



• SEP • 71

